SHARIMIDA 20 SL

Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίντ) 20%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή / και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Βλαβερό για τα πουλιά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή,** να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Imidacloprid : 20.00 % B/O
Βοηθητικές ουσίες: 82.25 % B/B

ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοποτίσματα (εντός θερμοκηπίου).
• **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
• **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
• **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Εσπεριδοειδή: **21,** Καπνός, Τομάτα, Αγγούρι, Αχλαδιά: **7,** Πατάτα: **14,** Βαμβάκι: **28,** Ροδακινιά: **14.**
• **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
• **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ'ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

280415

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ ⋮ Βλέπε Φιάλη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (lt)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14312 / 4.11.2008 / ΥΑΑ&Τ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: SHARDA EUROPE B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: SHARDA Balkan Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ. 210 6890144
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AGROTECHNICA OBEE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρουτ): **ΣΤΟΧΟΙ:** (α) **Εριώδης αλευρώδης** (Aleurothrixus floccosus), **ΔΟΣΗ:** 75 κ.εκ. (ml)/ 100 lt ψεκ. υγρού ή 150 – 300 κ.εκ. / στρέμμα σε 200 – 400 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**: Ψεκασμός φυλλώματος, **μετά την περίοδο ανθοφορίας**, με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2), **(β) Φυλλοκνίστης** (Phyllocnistis citrella), **ΔΟΣΗ:** 50 - 75 * κ.εκ. (ml)/ 100 lt ψεκ. υγρού ή 100 – 300 κ.εκ. /στρέμμα σε 200 – 400 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος, με την έναρξη της προσβολής, **μετά την περίοδο της ανθοφορίας.**
ΑΧΛΑΔΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: (α) **Ψύλλα Αχλαδιάς** (Cacopsylla pyri), **ΔΟΣΗ:** 60 κ.εκ. (ml)/ 100 lt ψεκ. υγρού ή 90 κ.εκ. / στρέμμα σε 150 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**: Με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση, έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71 – 79).
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Αφίδες (Myzus persicae, M. nicotianae), **ΔΟΣΗ:** 25-30 * κ.εκ. (ml)/ 100 lt ψεκ. υγρού ή 37.5 - 75 κ.εκ. / στρέμμα σε 150 – 250 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με την εμφάνιση της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71 – 79).
ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΟΧΟΙ: Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae), **Αλευρώδης** (Trialeurodes vaporariorum), **ΔΟΣΗ:** 50 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 – 50 κ.εκ. / στρέμμα σε 50 – 100 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προβολής.
ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΣΤΟΧΟΙ: Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum), **ΔΟΣΗ:** 75-125 (5) κ.εκ. / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης.
ΑΓΓΟΥΡΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): ΣΤΟΧΟΙ: Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum), **ΔΟΣΗ:** 75-125 (5) κ.εκ./στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ριζοπότισμα - Προληπτική εφαρμογή.
ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΤΟΧΟΙ: Αφίδες (Aphis gossypii), **ΔΟΣΗ:** 50 κ.εκ. / στρέμμα σε 50 – 100 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με την έναρξη της προσβολής **μετά την περίοδο ανθοφορίας**.
ΠΑΤΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ: Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae), **Δορυφόρος** (Leptinotarsa decemlineata), **ΔΟΣΗ:** 50 κ.εκ. / στρέμμα σε 50 – 100 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.
ΚΑΠΝΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ: Αφίδες (Myzus persicae, M. Nicotianae), **ΔΟΣΗ: (α)** 25 – 60 κ. εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-30 κ.εκ. / στρέμμα σε 50 – 100 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: (α)** Ψεκασμός φυλλώματος, με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής. **(β)** 50 - 100 (5) κ.εκ. / στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης.

*(* Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής).*

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ημέρες): Εσπεριδοειδή, Καπνός (ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής): 2 / 20 – 30, Αχλαδιά, Καπνός (ριζοπότισμα κατά την μεταφύτευση): 1, Ροδακινιά: 2 / 28, Τομάτα Υπαίθρου, Τομάτα Θερμοκηπίου, Αγγούρι (Θερμοκηπίου), Βαμβάκι, Πατάτα: 2 / 14.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στα Εσπεριδοειδή, σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου Cales noacki ωρίμων για ωοτοκία.
2. Στα Εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός), ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
3. Στα Εσπεριδοειδή, για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella), η μικρή δόση συνίσταται για μικρή πίεση προσβολής, ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
4. Στα Εσπεριδοειδή, σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής Εριώδη Αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (tank – mix) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
7. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.
8. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

CMYK