

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μακριά από θερμότητα, σπινθηρές ή φλόγες ή θερμές επιφάνειες. • Μην καπνίζετε. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια ή προστατευτικά ενδύματα ή μασκάρισμα προστασίας για τα μάτια ή πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή τον γιατρό. • Μην προκαλείτε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΘΗΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρισνο νερό και σαπούνι. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΘΗΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φάρμακα επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υπολογίσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε ή Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που δεσφαλώνει την αναπνοή. • ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΠΤΟΝ: Το προϊόν περιέχει έναν διαλυτή και έναν ανασταθμιστή της χολινεργικής. Προσέχετε τη χρήση της ενδύσης. Αποφύγετε τις σπινθηρές, οι φλόγες, όπως το 2-ΡΗΗ ή γρήγορα, μακριά από άσπαστη βλάστηση ή από χρηματοκιβώτιο κηφής, σε κάθε περίπτωση όπως σε συνδυασμό με Αρσενική, Προστατευτική ενδοαρθρική και ή ασπαστική άσπαστη, εάν είναι βλάστηση σπινθηρών. Ο κίνδυνος αναπνοής από τους πνευμονικούς πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με την τοξικότητα, όταν κινείται η κενάση του σταθμού. Πρακτικά συμπεριλαμβανομένη, Η θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού σε σχέση με τα συμπτώματα του ασθενούς.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Chlorpyrifos : 48.00% B/O
 (Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Dow AgroSciences, ΗΠΑ)
Βοηθητικές ουσίες: 54.10% B/B

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΑΣΣΗΤΙΚΩΝ & ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΡΑ ΑΝΑΣΤΕΛΜΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛ - ΧΟΛΗΝΗΣΤΕΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.:1790/17.02.1999/Υ.Α.Α. & Τ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ Ι
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΑGROTECHNICA OΒΕΕ
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: DOW AGROSCIENCES Ltd., UK



Agrotechnica
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
 info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

twomatch!

SIZE: 292x120
 COLORS: CMYK
 MIN FONT SIZE: 5.5pt
 CLP SIZE: 1.2x1.2cm
 COLOR CHANGE: 4 CMYK

CHLORPYRIFOS 48 EC

AGROTECHNICA

CHLORPYRIFOS (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΩΣ) 48%

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι ΣΤΟΧΟΣ Ι ΔΟΣΕΙΣ Ι ΜΕΤΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ι ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(I) ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟΜΑΤΟΣ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ): Ανάσπα, Βαμβακάδα, Καρπούζια, Φυλλοδέτες, Ζευζέρα, Κάστος, Ξυλόφαγα έντομα. Δόσεις: 150-312.5 κ.εκ./στρέμμα. 100-125 κ.εκ./100 ll ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Για την Ροδάκινα, εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59). Για τη Δαμάσκινα, να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69).
ΕΞΠΕΡΙΔΕΩΣΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΔΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΦ ΦΡΟΥΤ): Ψευδοκόκκος, Κάκκηνη ψώρα, Λεκανό, Αποιδιώτης, Ισέρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Λοπίες ψώδες, Θρίπες, Αφίδες, Ανθοθήρη. Δόσεις: 200-500 κ.εκ./στρέμμα. 100-125 κ.εκ./100 ll ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΜΗΛΟΣΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ): Καρπούζια, Ανθόνιμος, Υπονομιεύτης, Ψώρα του Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα, Ματώφαιρα, Φυλλορριπές, Ζευζέρα, Κάστος, Ξυλόφαγα έντομα. Δόσεις: 100-250 κ.εκ./στρέμμα. 100-125 κ.εκ./100 ll ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Για τις καλλιέργειες Μηλιά και Αχλαδία, εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59). Για την Κυδωνία, να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69).

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ): Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο ακούλη, Περίδη. Δόσεις: 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Για τις καλλιέργειες Κρεμμυδι & Μελιτζάνα, εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Για τις καλλιέργειες Τομάτα και Πιπεριά, εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59).

ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο ακούλη, Ρόδινο ακούλη, Σπιντοίπτερα, Αφίδες, Θρίπες. Δόσεις: 200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.

ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος, Φθορία, Αφίδες. Δόσεις: 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες). Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και πριν το σχηματισμό των κολλήδων (BBCH 10-59).

(II) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΚΚΟΥΛΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ), ΤΡΗΦΥΛΛΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΤΑΤΑ, ΣΠΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ: Σπυροσκοκκία, Υλέμια. Δόσεις: 520 κ.εκ./στρέμμα (καθολική εφαρμογή), 200 κ.εκ./στρέμμα (εφαρμογή σε λιπώδες ή αλιόνα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιομορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ. Πρασόγυρος, Χλωρίτσος, Ζήμπος. Δόσεις: 200 κ.εκ./στρέμμα (καθολική εφαρμογή), 100 κ.εκ./στρέμμα (εφαρμογή σε λιπώδες ή αλιόνα). Κορφοσκούλη. Δόσεις: 130 κ.εκ./στρέμμα (καθολική εφαρμογή), 80 κ.εκ./στρέμμα (εφαρμογή σε λιπώδες ή αλιόνα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 ll/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιομορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

ΣΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΑ: Σπυροσκοκκία, Υλέμια, Πρασόγυρος, Χλωρίτσος, Ζήμπος, Κορφοσκούλη. Δόσεις: 5 κ.εκ./10 τ.μ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος.

ΚΑΠΝΟΣ, ΤΟΜΑΤΑ: Σπυροσκοκκία, Υλέμια, Πρασόγυρος, Χλωρίτσος, Ζήμπος, Κορφοσκούλη. Δόσεις: 150 κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμογή κατά το φύτεμα με το νερό του ποτίσματος.

ΠΑΤΑΤΑ: Σπυροσκοκκία, Υλέμια, Πρασόγυρος, Χλωρίτσος, Ζήμπος, Κορφοσκούλη. Δόσεις: 200 κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής: Κατά το φύτεμα. Ψεκασμός του εδάφους στις αλιόναδες.

(III) ΔΟΛΟΜΑΤΑ: ΕΧΘΡΟΙ: Κορφοσκούλη, Πρασόγυρος, Δόση: 100 κ.εκ./στρέμμα, με 3 kg πτίουρα σε 1ll νερό και στη συνέχεια διασκορπισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΩΦΕΚΑΣΜΟΥΣ,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΑ, ΧΕΡΣΑΜΑ ΥΔΑΤΑ.



220316

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Βλέπε
 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΗ : Φύλη
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1 λίτρο (lt)**