

CHECK 50 WG



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡΘΡΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ/ΤΩΝ/100% ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΠΕΡΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ/ΤΩΝ/ ΣΤΡΩΜΑΤΙ	Όλες φυσιολογικές/σπέρμα (λίτρο/στρέμμα)		
ΕΣΤΡΑΓΟΛΕΜΗ (Πράσι φρούτ, Δεληλιά, Νουτρίνια, Γερμανικό Νουτρί)	Κορυμφοίρα (Puccinia blattaria), Σπογγώση (Sphaeria), Φυτοβόρρα κερρών (Phytophthora sp)	100	240 - 300	125-200	2	Εφαρμόξτε με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
ΑΜΥΓΔΑΛΑ	Κρύδηση φύλλων (Podosphaera aphanis)	100	160-240	100-150	3	Εφαρμόξτε το δείκτη 100% ύψους του Δεληλιά και επαναλάβετε μετά από 3-4 μήνες. Συντάξτε να φροντίζετε το χείμαρλό κλάδο μετά 1,5 m από το έδαφος.
ΚΑΡΥΔΑ	Ανθρακώση (Monilia blanda), Κρύδηση φύλλων & κερρών (Podosphaera aphanis)	100	160-240	100-150	3	Εφαρμόξτε που αρχίζουν να εμφανίζονται τα φύλλα και επαναλάβετε 10 ημέρες.
ΦΥΣΤΙΚΑ	Σπογγώση (Sphaeria sp)	100	160-240	100-125	4	Εφαρμόξτε: α. 21η πρώτη βροχή της βλάστησης, β. Όταν ο καρπός σφραγιστεί μήκος 1 cm, γ. Μετά από 20 ημέρες, δ. Άλλες φθινοπωρινές με τη συγκομιδή των καρπών.
ΦΟΥΤΟΥΛΑ	Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas sp)	100	160-240	100-150	3	Στις παραχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόξτε 60 λίτρα σφαιρών να πέσουν τα φύλλα και 60 Όταν παύσει το 70% των φύλλων.
ΜΗΛΟΒΛΗ ΜΥΛΑ ΑΙΤΑΙΔΑ	Φυτοβόρρα (Nectria parasitica), Σπογγώση (Sphaeria sp), Φυτοβόρρα (Podosphaera aphanis), Βακτηριακή (Pseudomonas sp)	200	200	100	3	Εφαρμόξτε το δείκτη που πέσει των φύλλων και στη συνέχεια της πρώτης και δεύτερης κορύφωσης, εφ' όσον οι ασθένειες εννοούν την ανάπτυξη των ασθένειων.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βραχικό, Καρσικό, Ρόδοινα, Δαυμασική)	Κορυμφοίρα (Sphaeria carophila), Ελάσσας (Peziza delectata), Κλάδοσπορηση (Cladobotryum carophyllum), Φυτοβόρρα (Podosphaera aphanis), Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas sp)	170	170-200	100-120	4	Στις παραχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόξτε 60 Το φθινοπώρο μόλις παύσει τα φύλλα και 60 Στο τέλος του χειμώνα πριν το άνοιγμα των κλαδών.
ΑΜΠΕΛΑ (σε επιτραπέζια & αμπέλι κλάσσο σπογγώση)	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora sp)	200	130-200	50-100	3	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 cm, μετά από 10 ημέρες, δύο και τρεις φορές ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΕΣΠΑ	Καυλώση (Cylindrium abscisum, Sphaeria abscisa), Γλευκώση (Cladobotryum abscisum), Καρυμφοίρα (Podosphaera aphanis)	200	300	150	2	Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή, το φθινοπώρο λίγο πριν την έναρξη των βλαστών και η δεύτερη την έναρξη στα το νέα φύλλα αποσπασμένων μήκος 2 εκτοπίων. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν εμφανίζονται κερρών και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Εφαρμόξτε μετά το κλάδο και μετά από χαλάδι ή παγετό.
ΔΑΧΥΛΑΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπέρι, Γκράσο, Κουκινάκι, Ραπανάκι, Μπαρό, Σέλινο, Φασόλι, Μπένδα)	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora sp), Κλάδοσπορηση (Cladobotryum sp), Σπογγώση (Sphaeria sp), Ανθρακώση (Cladobotryum sp)	240	120-240	50-100	3	Εφαρμόξτε από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επαναλάβετε μετά 10-14 ημέρες. Εφαρμόξτε όταν τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών να επαναληφθεί από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΤΟΜΑΤΑ (T + S)	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora sp)	200	125-250	50-100	2	Πρώτη φορά εφαρμογή, εφ' όσον ο καρπός αλληθές εννοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το έδαφος της δόσης είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ	Περωνόσπορος (Phytophthora infestans)	240	120-240	50-100	2	Εφαρμόξτε όταν τα πρώτα φύλλα είναι 15-20cm και επαναλαμβάνονται από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΣΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑ	Καρκοσπορηση (Cercospora beticola)	350	140	40	3	Εφαρμόξτε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας να επαναληφθεί από 10-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora sp), Φυτοβόρρα (Phytophthora sp)	200-300	140-300	50-100	2	Εφαρμόξτε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επαναλάβετε από 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Οι μερικές δόσεις αφορούν τους φασματικούς που υπάρχουν προς την άνοξη, ιδιαίτερα για το μηλόαυδο. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους φασματικούς που γίνονται όταν ο καρπός αλληθές εννοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το έδαφος της δόσης είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
 • Στο καρπών να αποφευχθούν οι φασματικές αλληθές διακοπές και κατά τις βροχές, όπως τις βροχές.
 • Οι φασματικές είναι προληπτικές και γίνονται εφ' όσον οι καρπός αλληθές εννοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
 • Στις καλλιέργειες μηλιάς, Εστραβόλας, Μυρτιάς, Πυρηνόκαρπα, Γάστρα, Ξύλα και Καρυμφοίρα από κλάδους να ακολουθούνται, στις παραχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των μηχανισμών προσιτοποίησης.
 • Η καλύτερη εφαρμοζόμενη ποσότητα ελαστικών ομοιομορφικών από καλαμπόρι πετρέλαιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα ποσότητα εφαρμογής σε μεταλλικό φυτό.

CHECK 50 WG



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΤΙΝΟΣΗΣ ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε να αναπνεύσετε αέρινη | αεριοφύματα.
 • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • Μην τρώτε, μην πιείτε ή καπνίσετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • Μοιράζετε τη χυμώδη ποσότητα.
 • Διάθεση περιεχομένου | περσική σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
 • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αρρώστια) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλιλίνη
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
 210 7793777

Μη ρουτίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερού από τις γεωργικές, εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). Κρατίστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

CHECK 50 WG

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50% COPPER OXYCHLORIDE, Cu 50%

ΕΤΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 Μεταλλικός Χαλκός (σε μορφή Οξυχλωριούχου Χαλκού) : 50.00% Β/Β
 Βοηθητικές ουσίες : 10.71% Β/Β

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.&Τ.: 60728 | 11.12.2018

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ | ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA O.B.E.E.

Agrotechnica
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
 www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu
 info@agrotechnica.gr

CHECK 50 WG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος.
 • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν είναι φυτοτοξικό στη ροδόκινά, κερσικά και βασιλοκίνα μετά το φούσκωμα των οφθαλμών, καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες της μηλιάς Golden Delicious, Jonathan, Reinette και Stamon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλάδι να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση κατά την άνθηση.
 • **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, με σκευάσματα mancozeb, maneb, thiram, captan, folpet και με ισχυρά οξέα και αμμωνία.
 • **ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.
 • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Εστραβόλας: 21, Ακρόβρου (Αμυγδαλιά, Καυδιά, Φιστάκι, Φουτοκιά): 28, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμοσμένο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι (για επιτραπέζια και αμπέλι κλάσσο σταφύλια): 21, Έλας: 21, Λαχανικά (Υ+Θ): 7, Τομάτα: Υπαίθρου:10, Θερμοκηπίου: 7, Πατάτα, Ζαχαρούλευκα: 21.
 • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σκακούλες, σκάκι μαζί με τα κομμάτια σφύρα καταστραφών προηγούμενης με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
 • **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Η απόθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, έρημο και σκοτεινό. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **1** κιλό (kg)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Βλέπε
 ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Ζωοκοσμίου
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

twomatch!
 SIZE: 18x34x3x0
 COLORS: white, yellow, pink, black
 MIN FONT SIZE: 5 pt
 CLIP SIZE: 1x1 1/2 inch
 COLOR CHANGE: 1 white, yellow, black