

# MAZA 4 SL

## **Imazamox 4%**

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

**Imazamox : 4.00% B/O**  
**Βοηθητικές Ουσίες: 96.22% B/B**

## ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

# ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ **ZANIOKTON**



ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΩΡΩΓΩΝΗ ΥΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΤΑ.**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,  
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2-BENZISOΦΗΑΖΟΛ-3-ΟΝΕ.  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΑΣΗ.**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**



**ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε  
**ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ** : συσκευασία  
**ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΛΑΣ**

## ΚΑΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

# 1 λίτρο (lt)

ΠΕΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΠΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	
<b>ΗΛΙΑΝΘΟΣ (HELAN)</b> Χρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια   ποικιλίες Ηλιανθού, τα οποία είναι αιθεκτικά σε μυδαζήλωνικά ζιζανιοκτόνα.	Πλατυφύλλα ζιζάνια	125 κεκ / στρέμμα	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/ στρέμμα)	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας.	1

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**Καταπολεμώμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti—ABUTH), Βλήτα (Amaranthus retroflexus—AMARE), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua—MERAN), Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουσουνιδιά (Chenopodium album—CHEAL).**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Διασυντακτικό, μεταφορικό ζεύκιστον με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση επίθασης, πλάτυψυλλών ζεύκινων σε ψειρίδια ή ποικίλες Ηλιαχθανού, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ωδαζόλωνική ζεύκιστον. Το Ιπαταγόν (οιδάμα ωδαζόλωνικα) αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS). **• ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φύλλωμάνων. **• ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γείστε το δοχείο του ψεκαστικού μηνύματας με νερό μέχρι τη μίστη. Προσθέτετε την αισιοδύτων ποσότητα οξειδώματος στο ψεκαστικό μηνύματας. Συμπλέρωστε με το υπόστρωμα την αισιοδύτων

**ανάδομα;** ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΗΤΑΣ, ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό σε υψηλάδια ποκίλων Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά στα ζανιοκύανα, στις συνιστώντας δόσεις και οδηγήσεις εφαρμογής. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΤΣΑΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ (ΗΜΕΡΕΣ):** Ηλίανθος: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του ακευαλάτου. (Εφαρμόζεται από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλα της καλλιέργειας). **ΕΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΦΥΤΟΥΧΕΣ ΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΜΟΓΚΕΣ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΝ ΑΠΟΚΕΙΣΤΕ:** Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εσδρή (επιδόμη, με οργανική ουσία < 2%) και σε έσδρη με υψηλό υφορέο ορίζοντα. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Να εφαρμόζοται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζανιοκύανων μεθόδους, καλλιέργυτη μέτρα κήπου, όπου αυτό είναι δυνατό καν να γίνεται εναλλαγή ζανιοκύανων (ζανιοκύανος διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφύγη αναπτήσεως ανθεκτικότητας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΠΔΑΣ** Η ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περιπτώσεις αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σταρπθούν την ίδια καλλιέργυτη περίοδο, λόγων ή αόριστων μετά από βαθιά άρση. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΡΟΥΠΟΥ Η ΤΟΝ ΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΟ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έγινε στεγνώσει το φεκαστικό υγρό πάνω στα φύτα, Σε περιπτώσεια εισόδου στον αγρό ομέως μετά την εφαρμογή οι εργάτες να φορούν κατελλήλως γάντια, μαρκύριων πονηρήσιμο και παντελόνι. **ΚΑΔΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αμέως μετά τον φεκασμό, καθαρίστε ενδέλεχως τον εξοπλισμό φεκασμού. Αδειάστε τελείως το φεκαστικό ύδωρ και έτηλνετε το δοχείο φεκασμού, την αντλία και τα μπρες 3 φορες, μέχρι να απομαρτυρισθούν τα ίγια του προϊόντος. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευάστατε λεπτώντας υπό την ήλιτρη τριπλό επέλιτα (τα νερά του επέλιτματος, τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλήμα, για τη διασφάλιση της πεπαρτερίων χρήσης, εναποτίθενται σε ομίχλη αυλογών για ανακύκλωσή ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΗΚΕΣΣ ΑΠΟΗΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το κοκεάδια παραμένει σταθερό ως δύο (2) χρόνια, όπως αποθηκεύεται στην αρκετή απαραίτηση συσκευασίας του, σε χώρο έδρα, δροσερό και καλά άσφαλτο, προστατευόμενο από υψηλές θερμοκαρδίες και άμεσο πλακιά φως.