

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

POMBAL 80 WG



POMBAL 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

POMBAL 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

POMBAL 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

POMBAL 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		γραμμ./100 lt φυεστικού υγρού	γραμμ./ στρέμμα (ήπα)	Όγκος φυεστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα)	
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ φρουτ, Φράπια, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά)	Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)	250 - 300	250 - 450	100 - 150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης. Δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο. Τρίτος ψεκασμός τον Οκτώβριο - Νοέμβριο.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φυτόφθορα Λαϊμού και Ριζών (Phytophthora cactorum)	250 - 300	200 - 360	80 - 120	Τρεις ψεκασμοί: Ο πρώτος τον Απρίλιο. Ο δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο. Ο τρίτος ψεκασμός τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποίηση & Επιτραπέζιο)	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	250 - 300	75 - 330	30 - 110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10 - 14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Φράουλα (Υ+Θ)	Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών (Phytophthora cactorum)	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.
Τομάτα (Υ+Θ)	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	200 - 300	200 - 300	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).
Αγγούρι Κολοκύθι Κολοκυθάκι (Υ+Θ)	Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	200 - 300	160 - 300	80 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ+Θ)	Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	200 - 300	160 - 300	80 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).
Μαρούλι (Υ+Θ)	Περονόσπορος (Brenzia lactucae)	200 - 300	100 - 300	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45).
Καλλωπιστικά* (Υ+Θ)	Φυτόφθορα (Phytophthora sp.)	250	100 - 120	250 - 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.
		5 - 10 γραμμ./ τετ. μέτρο	100	-	Ριζοτόπιαμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προαδοποιήσεων.
 *Πάνη την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δευτερευόντως η εφαρμογή του σε μέρη ριζώματος.
ΜΕΤΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΩΠΗΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Εσπεριδοειδή, Μηλιά: 3. Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο): 4 ανά 10 - 14 ημέρες. Φράουλα (Υ+Θ): 1-3 ανά 8-10 ημέρες (ψεκασμός φυλλώματος), 1 (εμβάπτιση ριζώματος). Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθα/Κολοκυθάκι (Υ+Θ): 1-3 ανά 8-10 ημέρες. Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ): 1-2 ανά 8-10 ημέρες. Μαρούλι (Υ+Θ): 1-3 ανά 10-14 ημέρες. Καλλωπιστικά (Υ+Θ): 1-3 ανά 30 ημέρες (ψεκασμός φυλλώματος), 1-2 ανά 30 ημέρες (ριζοτόπιαμα).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση περιεχομένου | περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα, που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα, στα οποία έπεσε σκεύασμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
FOSETYL AL : 80.00 % B/B
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ : 16.70 % B/B

ΕΝΔΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60.337 | 21.9.2012
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ASCENZA AGRO S.A.,
 Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 - 3ªA Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,
 Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), 190 11 Αυλώνας, Αττική Τηλ.: 22950 29350, Fax: 22950 29305
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το POMBAL 80 WG παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σποριών, αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
- ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος.
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3. Εσπεριδοειδή, Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος): 14. Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος):-, Μηλοειδή, Μαρούλι: 15. Αμπέλι (Οινοποίηση & Επιτραπέζιο): 28. Καλλωπιστικά:-.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις εφαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνιστάται η ανάμειξη του POMBAL 80 WG με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί, αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: : συσκευασία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: : συσκευασία

ΚΑΘΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ:
2.5 κιλά (kg)

50 1965 ΧΡΟΝΙΑ 2015
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Agrotechnica
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
 info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu

ΚΟΠΤΙΚΟ

twomatch!
 SIZE: 200x289x95
 COLORS: CMYK
 MIN FONT SIZE: 6.5 pt
 CLP SIZE: -
 COLOR CHANGE: cmyk