

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
- Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια | πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου | περιεχτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφ' όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC

Quizalofop-p-ethyl (Κουιζαλοφόπ-π-εθύλ) 5%
(χημική ομάδα: Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Quizalofop-p-ethyl: 5.00% B/O
Βοηθητικές Ουσίες: 94.60% B/B

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ & ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ.: 7808/9.1.2007/ΥΑΑ&Τ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠ.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5, 11526 Αθήνα, Τηλ.: 210 6921332
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΙΑΣ: AGROTECHNICA ΟΒΕΕ

50
1969-2019
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu



ΕΣΥΡ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΗΛΟΞΙΔΗ (Μηλιά)
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά)
ΜΟΥΡΑ & ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Φράουλα)
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθη, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραβίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιτέλια, Αρακάς)
ΟΣΠΡΙΑ (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια)
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια, Ηλιάνθος, Βαμβάκι)
ΠΑΤΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Μηδική)
ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ (α)
ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ (β)

ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. /στρέμμα)

100 - 150
200 - 300

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 30 – 40 lt ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. • **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Μεταφύτευτικά από το στάδιο των 2 – 3 φύλλων μέχρι το αδερφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια. Το *Cynodon dactylon* καταπολεμάται καλύτερα όταν έχει ύψος 15 – 20 εκ. • Το *Sorghum halepense* καταπολεμάται καλύτερα όταν έχει μικρό βλαστό (βλαστό) 45 – 50 εκ. • Η προληπτική (ετήσια) καταπολέμηση όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμμα. • **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:** Μία (1) εφαρμογή. • **ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: (α) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:** Αλεπουρούς (*Alopecurus* spp.), Ανεμόχορτο (*Apera spicaventi*), Βρωμή (*Bromus* spp.), Δακτυλίδες (*Dactylis* spp.), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Έλευσινη (*Elyusine indica*), Κρήθια (*Hordeum* spp.), Ήρες (*Lolium* spp.), Φαλαρίδες (*Phalaris* spp.), Πάνικο (*Panicum* spp.), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*), Σιτάρι (*Triticum* spp.). • **(β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:** Αγρόπυρο (*Agropyron repens*), Αγρωστίς (*Agrostis stolonifera*), Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Πάσπαλο (*Paspalum* spp.), Βέλιουρας από ριζώματα (*Sorghum halepense*). • **ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Όλα τα πλατύφυλλα. • Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. • Να μην ψεκάσετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και οι καλλιέργειες δεν είναι ειρωτικές.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκάσιμος του φυλλώματος των ζιζανίων με 30 – 40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 PSI (2-3 atm). Χρησιμοποιήστε μικρό τύπου σκούπας. • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευαστικού στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας, συμπληρώνοντας το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στα σπέρμα και στις μη εύρωστες, πλατύφυλλες καλλιέργειες. • **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος και πρέπει να αποφεύγεται. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Κολοκύθη: 7, Μηδική: 21, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια: 21, Ηλιάνθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα: 35, Ραβίκι, Μπιτέλια, Σκόρδο: 49, Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά: 56, Ζαχαρότευτλα, Σόγια: 60, Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο: 70, Βαμβάκι: 80. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Την επόμενη και μη φυτεύετε σπέρμα πριν περάσουν τρεις (3) μήνες από την εφαρμογή του. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες. • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτιθενται σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. • **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Στην αρχική, απαράβατη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και την άμεση έκθεση του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

110620
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝΣ. : Φιάλη
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (lt)

twomatch!

visual communication services

SIZE: 267x130

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5.3 pt

CLP SIZE: 2x2cm

COLOR CHANGE: 4