SHARIMIDA 20 SL

Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίντ) 20%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση περιεχομένου | περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή | και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή,** να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Imidacloprid : 20.00 % B/O
Βοηθητικές ουσίες: 82.25 % B/B

ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού/ στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
ΤΟΜΑΤΑ (Θ) LYPES	**Αλευρώδης** *(Trialeurodes vaporariorum)* **TRIAVA**	-	-	75-125 (1)	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ) CUMSA	**Αλευρώδης** *(Trialeurodes vaporariorum)* **TRIAVA**	-	-	75-125 (1)	Ριζοπότισμα - Προληπτική εφαρμογή	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
(2) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
(3) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ριζοπότισμα (εντός θερμοκηπίου).
• **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
• **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: (ημέρες):** ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ): 7.
• **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
• **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14312 / 4.11.2008 / ΥΑΑ&Τ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: SHARDA CROPCHEM ESPANA S.L.,
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μπαϊρακτάρη 5, 11526 Αθήνα, Τηλ.: 210 6921332
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA OBEE

140220

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

50 ΧΡΟΝΙΑ 1965 2015 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu

ΕΣΥΦ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ
: Βλέπε Φιάλη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 λίτρο (lt)

twomatch!
visual communication services

SIZE: 267x130
COLORS: MYK
MIN FONT SIZE: 6 pt
CLP SIZE: -
COLOR CHANGE: MYK