

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%

VITRA 40 WG



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

• ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γρέφι φρούτ, Λεμονιά, Μαντολιά, Πορτοκαλιά), **ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κορυμβόζη, Ανθράκωση, Σαπτορώση, Προβόλη κλαδών, φύλλων & καρπών, **ΔΟΣΕΙΣ:** 65-110 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 200-250 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τις ασθένειες Κορυμβόζη, Ανθράκωση και Σαπτορώση: Εφαρμόγες με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Για την Προβόλη κλαδών, φύλλων & καρπών: Εφαρμόγες πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάση παγετού. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κορυμβόζη, Εξάνθημα καρπών και κλάδων, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-200 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100-150 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για την ασθένεια Κορυμβόζη: Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόγες το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν την έναρξη των εμβροχών οφθαλμών. Για την Εξάνθημα καρπών και κλάδων: Εάν υπάρχουν ενδείξεις για το βακτηριακό σύνδρομο, συνιστάται επανόληψη της εφαρμογής κατά την έναρξη. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΚΑΡΥΔΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Ανθράκωση, Κηλίωση φύλλων και καρπών, **ΔΟΣΕΙΣ:** 135-200 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100-150 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Οι εφαρμογές ανάλογα με την ανάπτυξη του φυλλώματος και επανόληψή τους κάθε 10 ημέρες. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Φουγγαρίδιο, Σαπτορώση, Φαειά ζημία, Βακτηρίωση, Βακτηριακό κολίμιο, **ΔΟΣΕΙΣ:** 135-235 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τις ασθένειες Φουγγαρίδιο, Σαπτορώση και Φαειά ζημία: Εφαρμόγες το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πρόωξης κορυμής, Για τη Βακτηρίωση και το Βακτηριακό κολίμιο: Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες συνιστάται δύο (2) εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κορυμβόζη, Φαειά ζημία, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-205 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100-120 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τις ασθένειες Κορυμβόζη: Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόγες α) το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δένδρωση των οφθαλμών. Για τη Φαειά ζημία: Κατά τη δένδρωση των οφθαλμών και στη ροδόνη κορυμής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κορυμβόζη, Προβόλη από *Pseudomonas syringae*, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-210 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100-120 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόγες α) το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δένδρωση των οφθαλμών. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κορυμβόζη, Εξάνθημα καρπών, Κλαδοσπορίωση, Φαειά ζημία, Βακτηριακό κολίμιο, **ΔΟΣΕΙΣ:** 135-210 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100-120 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τις ασθένειες Κορυμβόζη, Εξάνθημα καρπών, Κλαδοσπορίωση: Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόγες α) το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δένδρωση των οφθαλμών. Για την Φαειά ζημία: Κατά τη δένδρωση των οφθαλμών και στη ροδόνη κορυμής. Για το Βακτηριακό κολίμιο: Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόγες στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΜΠΕΛΙΑ** (για επιτραπέζια και οπωροφόρα σταφύλια), **ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Περονόσπορος, Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-220 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 50-150 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόγες από τον αρχικό άνεμο περίπου 10 εκστ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνεση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΕΛΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κηλίωση, Γλαυκοσπορία, Κορυμνική, **ΔΟΣΕΙΣ:** Για τις ασθένειες Κηλίωση και Κορυμνική: 295 (φθινόπωρο), 135 (άνεση) γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό και για το Γλαυκοσπορία: 295 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 150 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για την Κηλίωση, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόγες από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές Άνοιξης. Για το Γλαυκοσπορία: Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίσουν να καρπιάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Για την Κορυμνική: Εφαρμόγες μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάση παγετού. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 2. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ), ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Περονόσπορος, Κλαδοσπορίωση, Σαπτορώση, Ανθράκωση, Βακτηριακές, **ΔΟΣΕΙΣ:** 310 (βραδεία προσβολή), 195 (βαρύτερη προσβολή) γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 50-100 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τον Περονόσπορο: Εφαρμόγες από το στάδιο των νεαρών απορροφώντων και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες. Για τις ασθένειες Κλαδοσπορίωση, Σαπτορώση και Ανθράκωση: Εφαρμόγες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής και για τις Βακτηριακές: Εφαρμόγες από το στάδιο των νεαρών φυτών μέχρι την καρποδέση. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΚΟΚΚΥΝΟΕΙΔΗ (Υ+Θ) (ΛΥΚΟΥΡΑ, ΚΟΚΚΥΝΑ, ΠΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΡΝΙΟΥ), ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Περονόσπορος, Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Βακτηριακή, **ΔΟΣΕΙΣ:** 135 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 50-100 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθένειών και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΒΑΒΟΥΝΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κλαδοσπορίωση, Βακτηριακή, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-170 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 50-80 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για την ασθένεια Κλαδοσπορίωση: Εφαρμόγες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 7-14 ημέρες. Για τις Βακτηριακές: Εφαρμόγες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθένειών και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΣΕΝΙΝΟ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Σαπτορώση, Κλαδοσπορίωση, **ΔΟΣΕΙΣ:** 165-170 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 80-80 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόγες από τα μέσα έως τον τέλος Αυγούστου, και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΡΧΑΔΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κλαδοσπορίωση, **ΔΟΣΕΙΣ:** 225 γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 60 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόγες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΠΑΤΑΤΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Περονόσπορος, Ανθράκωση, **ΔΟΣΕΙΣ:** 225 (βαρδεία προσβολή), 135 (λαγύρα προσβολή) γραμμ./100 lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 50-100 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόγες από τα μέσα έως τον τέλος Αυγούστου, και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4. • ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΖΑΧΑΡΟΤΥΓΙΛΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** Κλαδοσπορίωση, **ΔΟΣΕΙΣ:** 335 γραμμ./100lt ψεκ. υγρό, **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 40 λίτρα (li) στρέμμα, **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόγες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4.**

ΔΕΛΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

VITRA 40 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε να αναπνεύσετε ατμό ή ενσφαιμάτια.
- Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Μοζάψτε τη χυμμένη ποσότητα.
- Διάθεση περιεχομένου ή περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση κατάποσης, χρησιμότητα γάλα ή νερό (για αραιώση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για πλήρη οδηγίες και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλιλίμνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΠΙΒΑΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΕΠΙΤΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΦΟΒΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΤΤΩΣΕΣ
Μην ρυπαίνετε τα νερά με το περιεχόμενο ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επικοινωνία νερά.) Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερού από τις γεωργικές επιχειρήσεις και τους όρμους.

ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ:
1 κιλό (kg)

VITRA 40 WG

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%
COPPER HYDROXIDE, Cu 40%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μεταλλικός Χαλκός Cu, σε μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού : 40,00 % B/B
Βοηθητικές ουσίες : 30,19 % B/B

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυβλ.: 60744_12.12.2018

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ALINTRA S.A., Garbí 3, Poligono Industrial Can Volant, 08150 Parets del Vallès, Barcelona, Spain
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: AGROTECHNICA OBEE



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, FAX: 2310 797 263
www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu
info@agrotechnica.gr



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμους φυλλώματος.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μισή ΡΙΣΗ της απαιτούμενη δόση του σκευασμού ανά στο ψεκαστικό δοχείο αναλόγως συντάρα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναλόγως την απόδοση.
- **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΩΘΕΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμειλίω Δελματί, Ροσέτα, Νεφέρα και Corcová. Είναι φυτοτοξικό στα πυρήνη-κορπία μετά την έναρξη των φύλλων. Επεισοδιασθένειες χρήσης στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χροιάσμα. Στη μελίμια οι εφαρμογές να σταματούν όταν η ροδόνη κορυμής είναι μικρός 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνεση. Οι κίνδυνοι φυτοτοξικότητας αυξάνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες (< 5 °C) και σε υγρασία.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κόνι μετά συσκευασίας (σκόνη, σάκκο), μαζί με τα κούτι αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόνη για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται όλα σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή αντίστροφη ενέργεια. Αποφύγετε τη επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
- **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΓΕΝΑΘ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΚΩΜΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** (ημέρες: **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** 21, **ΑΡΧΑΔΙΑ** (Αμυγδαλιά, Κορμόβη), **28**, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΚΑ: Μη εφαρμογές καθόλου από το στάδιο άνεσης της καλλιέργειας κατά την καρπίαση. **ΑΜΠΕΛΙΑ** (για επιτραπέζια και οπωροφόρα σταφύλια): 21, **ΕΛΙΑ:** 21, **ΑΧΛΑΔΙΑ** (Υ+Θ): 7, **ΤΟΜΑΤΑ:** ημερομηνία 11, **Θερμοφρούτα:** ΠΑΤΑΤΑ, ΑΡΑΒΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΤΥΓΙΛΙΑ).
- **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευασματα, όξινα σκευασματα, με σκευασματα που περιέχουν θειάμι και με πολυουρφώδη.
- **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Καταργήστε το παρασχημα δύο (2) μήνες από την εφαρμογή της για 21 ημέρες.
- **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αεραία του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και σε κωνική συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερά για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι μικρές δόσεις αρρούν τους ψεκασμούς που πληθαίνουν προς την άνεση, ιδιαίτερα για το μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αρρούν τους ψεκασμούς που γίνονται στον α καρπών συνθήκες συνόρου την ανάπτυξη των οφθαλμών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα είναι εμφανή, το μέρος της δόσης, ένα ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Στο λαγύρα να απορριπτόντα οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται αρρούν τα καρπών συνθήκες συνόρου την ανάπτυξη των οφθαλμών.
- Στις καλλιέργειες Αμυγδα, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρήνοκαρπια, Πατάτα, Ελιά και Αχλαδιά υπό κλίμα με υστεροβόνοτα, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών παρασκευασμάτων.
- Η αναλυτή εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλαρών σκευασμάτων ανά καλλιέργεια περίπου 500 lt πρέπει να υπερβαίνει τα 450 γραμμ ανά σημείο συλλογής εφαρμογής σε μεταλλικό γάλα.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: [ΕΛΤΕ] συσκευασία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: [ΕΛΤΕ]

ΚΟΠΤΙΚΟ CMYK

twomatch!

visual communication services

SIZE: 183x90x243

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5.3 pt

CLP SIZE: 2.7x2.7cm

COLOR CHANGE: 4 CMYK