

STERMIBROM PASTA BAIT

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)
(σε φακελάκι από διηθητικό χαρτί (filter paper), δόλωμα 10 γρ.)

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

Αρ. Έγκρ. Κιν.Α. (ΥΑΑ&Τ): ΤΤ114-0025 / 20-6-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Bromadiolone : 0.005% B/B
Βοηθητικές Ουσίες: 99.995% B/B
Περιέχει τον μικροβιολογικό αντιπρωτεϊνικό παράγοντα: Denatonium benzoate

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙΛΠΕ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, μη πιείτε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πληγαστούν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).
- Πλύνετε τα χέρια και τα αγκύλιατα μέρη του σώματός πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα, θα πρέπει να αποσημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων, θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΩΤΟ

- Εάν ζητήσετε κατηχητική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον παρακάτω του προϊόντος.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Η Βρομαδιολόνη (Bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία (ή έναρξη της αιμορραγίας) μέχρι να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προδρομικής (NR) στην εμφάνιση του παρακάτω φαινομένου και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προδρομικής είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 6-10 mg βιταμίνης K1 (φουμαριδίου) μέσω αρχής ενδοφλέβιας ενέχυσης (100 mg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Εξουδεκνώνεται να χρειασθεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε άμεσα και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής - εάν υπάρχουν - μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (αιμορραγίες, αίμα στα ούρα, αιμάτιση, εφρκικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξης του αίματος).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μόλις μερικά ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης ομοία με τα παραπάνω.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με εφρόνο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δειγνώντας την ετικέτα. Μην προκαλέτε εμετό εκτός και εάν συμβουλευτείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.
- **ΑΝΤΙΔΩΤΟ:** Βιταμίνη K1 (υπο-ιατρική παρακολούθηση).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

- Αναζητήστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με το τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει ρυθμίσει από τα τρωκτικά.
- Τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **200 γραμμ. (g)**
20 ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 10 ΓΡΑΜ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Lot No.) : Βλέπε σφραγίδα ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date): (see stamp)

STERMIBROM PASTA BAIT

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

STERMIBROM PASTA BAIT

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)
(σε φακελάκι από διηθητικό χαρτί (filter paper), δόλωμα 10 γρ.)

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΣ: PestNet International S.r.l. Via Ligo Frazzola 6, 39 131 Padova, Italia, Tel. +39 049 950 1697
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10674 Αθήνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Zapi S.p.A., via Terna Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Italia
ΔΙΑΝΟΜΕΑΙΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΕΕΕ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙΛΠΕ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus norvegicus*). Αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.
- **ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΔΟΣΕΙΣ:**
ΣΤΟΧΟΣ: Ποντίκι (*Mus musculus*).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΔΟΣΕΙΣ: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα (μέτρες προσβολές). Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα (σκληρές προσβολές).
- **ΣΤΟΧΟΣ:** Αρουραίοι (*Rattus norvegicus*).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΔΟΣΕΙΣ: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα (μέτρες προσβολές). Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα (σκληρές προσβολές).
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών. Για χρήση κατά των αρουραίων από μη επαγγελματίες χρήστες, τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών, που φέρουν προστασία από τοξικοποίηση (baiter resistant). Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διαφόρες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσεγγίσιμες από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταποσίσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικά σταθμοί ασφαλείας (baiter resistant), θα πρέπει να αναφέρονται ειδικά επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συλλέγονται με άδουκα δολωματικούς σταθμούς. Η δόλωση αρχίζει όταν τροφούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά. Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Τα δολώματα πρέπει να επανεξετάζονται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά. Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Τα δολώματα θα πρέπει να παραμένουν στο χαρτί τους ασυσκευασμένα. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολωμάτων που είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μία θέση δόλωσης (ποντικού ή αρουραίου). Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διακινούνται ή τρώγονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ετικέτα του.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φραγμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω κάψης.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχήμο και να ενσωματώνονται σε σημεία αυλάνης με ανασφάλιση ή ανάκτηση ενέργειας.
- **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΕΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΕΡΕΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕ ΞΑΝΘΟΠΥΡΡΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α.Ε.Ε.) ΑΛΛΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΚΑΛΥΠΤΙΚΑ