

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

STERMIBROM PELLET

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΟΥΦΕΤΟ (PELLET)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ
ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)**
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Βρομαδιολόνη : 0.005% B/B
Βούρητηξ Ουρίς : 99.995% B/B
Περιέχει τον πικροτοκό - απογερατικό πορόδυντο: Denatonium benzocate

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Μακριά από παιδιά. • Ιδιαίτερα την επικέτα που τη χρήση σε φυλασσόμενα κατόπιν δεν χρησιμοποιείται το προϊόν. • Μην τοποθετείτε το σκευασμά σε μερινό οπού είναι ευκολό να πληριάσουν άλλα ζώα κατακλυστά μερινό του σωματού πριν φαγετε, που θα ηρθετε και θα τον εγκαρφούν. Οποτε σε όροι ωματού πρέπει να προσταστούν σε σημαντικούς χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα, θα πρέπει να επισήμανται υπάρχουν δολώματα. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται σε περιοχές όπου η γάτα ή ο γάτος αναφέρεται ο κύνηνος πρωτεύοντος και δευτερογενώς δηλητηριάστηκε από αντιπηκτικό τρωκτικούτονο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολώματων, θα πρέπει να ανάρρεγονται και να πρωτεύει βοηθείας σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ή ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήστε ιατρική συμβούλη, να έχετε μάζα στον περιοριστικό προϊόντος. Η Bromadiolone που ενέχουμενας να προκαλέσει αιμορραγία (η ενέργεια της αιμορραγίας μπορεί να συντρέψει την ζωή της γάτας σε λίγες ώρες). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να κατατεληφθεί ο χρόνος προθρούβιντης (INR) στην εφανάστη του πέριστατικού αικόνη και σε 48 - 72 ώρες μετά την εκθεσή. Αν ο χρόνος προθρούβιντης είναι μεγαλύτερος από την επομένη εποχή, η γάτα πρέπει να παρακολουθηθεί από την περιοχή K1 (φυτοφαρμακευτικά μέσω αργίας ενδοφέρεις εγχύσης (100 μαγ/κιγ σωματικού βάρους για παιδιά)). Ενδεχομένως να χρειασθεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το σώμα ή ενδοφέρεις) για αρκετές εβδομάδες.
- **Σε περίπτωση παρεμβολής με τα δάκτυλα, κρατήστε τα μάτη συνορτάκας απενόχοντας και απαλά με νέρο για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφορίστε τον/τα φακό/ας έπωφης - εάν υπάρχουν - μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να έσπινετε τα δάκτυλα. Παρακαλούμενης στον αρρεβότη για συντηρητικές σημάνσεις (αναρρυγμός, αιώνια μάτα, απότομη αρρώστια και ασυνταγματικός πόνος στην κοιλική χώρα, βάρια στα ούρα, αιώρη γραυού πτηξίσματος του αύρατος).**
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μόλυβνα σύρκη και πλυντείτε τα πόντα την επόμενη χρήση. Αν η επαφή έγινε με την μάτη, αποθετείται με αναθρώπινη σαπούνια με την επόμενη χρήση.**
- **Σε περίπτωση καταπολοπής, ξεπλύνετε το στόμα με αφρόνιο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβούλη δείχνοντας την επικέτα. Μην προκαλέσει εμετό εκπτώσης και εαν συμβουλεύεται σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων, η γάτη προηγεται στην περιοχή που έχει ηγετεί η παραγένεση τους. • Η γάτη του θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα στόμα που ακολουθούν αντιπηκτικά αγωγές.**
- **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Βιταμίνη K1 (από ιατρική παρακολούθηση).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:
• Ανατρέψτε την επικέτα του προϊόντος και έβαγτε τα λύκατα σε τούρτα που έχει υποδέχεται δολώματα; Η πούλη δεν έχει φράγκει από τα τρωκτικά. • Τα αντιπηκτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με λόγοι ασύρματης σύνδεσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΟΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΗΦΙΚΕΣ ΑΠΟΦΗΓΗΣΗΣ: Στην αρχική, ιδεατή συσκευασία του, σε έγραφη μορφή συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναρροφηθεί. Η αναρρύγηση πρέπει να καταστέφεται στη σημείωση όπου έχει δημοπράτησεται. Οι δολώματα στοιχείο θα πρέπει να προστατεύονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται η διάρκεια της ζωής των δολωμάτων. Η διάρκεια της ζωής των δολωμάτων δεν θα πρέπει να αναφέρονται και οι πώλητες βοηθείες σε περίπτωση δηλητηρίσεως. Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χέρι της συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιγράψεται τη στάθερότητα δολωμάτων σε έναν αριθμό ημέρας (π.χ. 120 ημέρες ή αριστερά). Οι δολώματα στοιχείο θα πρέπει να προστατεύονται στη σημείωση όπου έχει δημοπράτησεται. Εδώ γράφεται η προστασία της προστίμης στην πρώτη πώληση. Η γάτη του προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται συμφωνά με τα όρια αναρρύγησης στην επικέτα του. Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναρροφούνται στην πρώτη πώληση. Μη δημοπράτηστα βοηθεία στοιχείο θα πρέπει να ανακριθούνται. Μη δημοπράτηστα δολώματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω κώλων.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Ο. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

QR code

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

STERMIBROM PELLET

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0.005%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΟΥΦΕΤΟ (PELLET)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ
ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)**
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: ΤΠ14-0023 / 20.6.2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: PestNet International S.r.l., Via Ugo Foscolo 8, 35131 Padova, Italy, Tel.: +39 049 950 1667
ΥΠΕΥΧΟΥΝΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΟΤΑΧΑΗ ΑΕ, Μουρουζή 9, 10674 Αθήνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ι ΠΙΕΥΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Zapi s.p.a., via Terza Strada 12, 35026 Conselice (Padova), Italy
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ AGROTECHNICA ΟΒΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Σχολικό αντιπηκτικό τρωκτικού, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus norvegicus). Άρκεντα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατητικός δόση.
- **ΣΤΟΧΟΣ | ΝΕΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΟΙΣΤΕΣ:** Το προϊόντος θεραπεύει τα δολωμάτα της Εστιατορίου χώρα και γύρω από κήπους.
- **ΔΟΣΗΣ:** Μόρια 50 γρ. δολώματας ανά θέση δολωμάτας κάθε 5 μέτρα (έκτασης προσβάσια). Μόρια 50 γρ. δολώματας ανά θέση δολωμάτας κάθε 5 μέτρα (έκτασης προσβάσιας).
- **ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:** Αρουραίο (Rattus norvegicus).
- **ΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Εστιατορίου χώρα και γύρω από κήπους.
- **ΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Εστιατορίου χώρα και γύρω από κήπους δολωμάτας προσβάσιας προσβάσιας.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κήπων και γύρω από κήπους αστεριών, καταπόλεμης ποντικών και αρουραίων. Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κήπων αστεριών, καταπόλεμης ποντικών και αρουραίων. Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κήπων αστεριών, καταπόλεμης ποντικών και αρουραίων.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κήπων και γύρω από κήπους αστεριών, καταπόλεμης ποντικών και αρουραίων.
- **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήστε ιατρική συμβούλη, να έχετε μάζα στον περιοριστικό προϊόντος. Η Bromadiolone που ενέχουμενας να προκαλέσει αιμορραγία (η ενέργεια της αιμορραγίας μπορεί να συντρέψει την ζωή της γάτας σε λίγες ώρες). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να κατατεληφθεί ο χρόνος προθρούβιντης (INR) στην εφανάστη του πέριστατικού αικόνη και σε 48 - 72 ώρες μετά την εκθεσή. Αν ο χρόνος προθρούβιντης είναι μεγαλύτερος από την επομένη εποχή, η γάτα πρέπει να παρακολουθηθεί από την περιοχή K1 (φυτοφαρμακευτικά μέσω αργίας ενδοφέρεις εγχύσης (100 μαγ/κιγ σωματικού βάρους για παιδιά)). Ενδεχομένως να χρειασθεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το σώμα ή ενδοφέρεις) για αρκετές εβδομάδες.
- **Σε περίπτωση παρεμβολής με τα δάκτυλα, κρατήστε τα μάτη συνορτάκας και απαλά με νέρο για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφορίστε τον/τα φακό/ας έπωφης - εάν υπάρχουν - μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να έσπινετε τα δάκτυλα. Παρακαλούμενης στον αρρεβότη για συντηρητικές σημάνσεις (αναρρυγμός, αιώνια μάτα, απότομη αρρώστια και ασυνταγματικός πόνος στην κοιλική χώρα, βάρια στα ούρα, αιώρη γραυού πτηξίσματος του αύρατος).**
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μόλυβνα σύρκη και πλυντείτε τα πόντα την επόμενη χρήση. Αν η επαφή έγινε με την μάτη, αποθετείται με αναθρώπινη σαπούνια με την επόμενη χρήση.**
- **Σε περίπτωση καταπολοπής, ξεπλύνετε το στόμα με αφρόνιο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβούλη δείχνοντας την επικέτα. Μην προκαλέσει εμετό εκπτώσης και εαν συμβουλεύεται σχετικά με σημάνσεις, σημειώστε την σημείωση όπου έχει δημοπράτησεται. Οι δολώματα στοιχείο θα πρέπει να προστατεύονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται η διάρκεια της ζωής των δολωμάτων από τα στόμα που ακολουθούν αντιπηκτικά αγωγές.**
- **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Βιταμίνη K1 (από ιατρική παρακολούθηση).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣ