

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	Μένιστη δόση: 50 ml/δενδρό 200 ml/100 lt νερό	Διασκορπίζουμε ομοιόμορφα στη ζώνη ενστάλαξης των δένδρων. Δεν επαναλαμβάνουμε μέσα σε 3 χρόνια μετά την εφαρμογή και δεν γίνεται εφαρμογή σε νεαρά δένδρα. Εφαρμόζουμε όχι παραπόνω από μία φορά το χρόνο με ψεκασμό πλήρους κάλυψης.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλά, Αχλαδιά	100 - 200 ml/100 lt νερό	Δύο (2) εφαρμογές: Μία εφαρμογή πριν την άνθηση και μία μετά την καρπόδεση.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδοκάνια, Βερικοκά, Δαμασκηνά, Κέρασος	100 - 200 ml/100 lt νερό	Δύο (2) εφαρμογές: Μία εφαρμογή πριν την άνθηση και μία μετά την καρπόδεση.
ΑΜΠΕΛΙ	100 ml/100 lt νερό 200 ml/100 lt νερό	Δύο (2) εφαρμογές: 1. Λίγο πριν την άνθηση και 2. Μετά τη συγκομιδή.
ΕΛΑΙΑ	200 - 300 ml/100 lt νερό	Δύο (2) εφαρμογές: Μία εφαρμογή πριν την άνθηση και μία μετά την καρπόδεση.
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΛΑΧΑΝΟ, ΜΠΡΟΚΟΠΟ	75 ml/100 lt νερό	Εφαρμόζουμε όταν απαιτείται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης. Επαναλαμβάνουμε μετά το σχηματισμό των νέων φύλλων. Εάν απαιτείται, εφαρμόζουμε και 3 ^ο ψεκασμό.
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	150 ml/100 lt νερό	Εφαρμόζουμε την πρώτη εφαρμογή, 3 εβδομάδες μετά την εγκατάσταση των φυτών και επαναλαμβάνουμε 3 εβδομάδες αργότερα.
ΑΡΑΧΙΔΑ	35 ml/στρέμμα	Εφαρμόζουμε ανά 21 ημέρες, 4 - 5 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	75 ml/στρέμμα	Εφαρμόζουμε όταν απαιτείται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης. Επαναλαμβάνουμε μετά το σχηματισμό των νέων φύλλων. Εάν απαιτείται, εφαρμόζουμε και 3 ^ο ψεκασμό.
ΠΑΤΑΤΑ	35 ml/στρέμμα	Εφαρμόζουμε ανά 21 ημέρες, 4 - 5 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
ΜΗΑΙΚΗ	50 - 150 ml/στρέμμα 0.5 - 1.5 lt/στρέμμα	Προηληπτική Εφαρμογή (Συντήρηση): Εφαρμόζουμε ψεκασμό πλήρους κάλυψης, 10 ημέρες μετά από κάθε κοπή. Η δόση εξαρτάται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε αργιλό. Όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα του αργιλίου, τόσο μεγαλύτερη και η ενδεδειγμένη δόση. Θεραπευτική Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε ψεκασμό πλήρους κάλυψης, αμέσως μετά την κοπή, όταν η ανάλυση των νων 15 cm του φυτού πριν την άνθηση, περιέχει λιγότερο από 20 mg Βορίου/kg (20 ppm) πριν την άνθηση. Η δόση εξαρτάται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε αργιλό. Όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα του αργιλίου, τόσο μεγαλύτερη και η ενδεδειγμένη δόση.
ΒΑΜΒΑΚΙ	38 - 75 ml/στρέμμα	Εφαρμόζουμε ψεκασμό κατά τη διάρκεια της άνθησης, όπου έχει αναγνωρισθεί τριφοτενία Βορίου.
ΚΑΠΝΟΣ	35 - 75 ml/στρέμμα	Εφαρμόζουμε ανά 21 ημέρες, 4 - 5 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	100 - 150 ml/100 lt νερό	Εφαρμόζουμε 2 - 3 ψεκασμούς κατά μηνιαία διαστήματα. Ξεκινώντας αμέσως μετά την εγκατάσταση των φυτών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

change color 1 black

AGROLIP B

ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΟΡΙΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ ΒΟΡΙΟΥ (B)

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 2003/2003/EK)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Βόριο (B), με τη μορφή H₃BO₃: 130 g/lt (115 g/kg),
πλήρως υδατοδιαλυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το AGROLIP-B μπορεί να εφαρμοσθεί σε μείγματα δεξαμενής, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζιζανιοκτόνων, διαφυλλικών λιπασμάτων και ουρίας.

Το AGROLIP B δεν συνδυάζεται με Θεϊκό Ψευδάργυρο, Θεϊκό Μαγγήσιο, Θειασβέστιο ή με ελαιοναμείχμα σκευασμάτων.

Το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το σπόρο.

• ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν εφαρμόζεται είτε με διαφυλλικούς ψεκασμούς, είτε με εφαρμογή στο έδαφος.

(α) ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

(β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: Εφαρμόζουμε επαρκή ποσότητα φυκαστικού υγρού, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη κάλυψη. Για την βέλτιστη λήψη από το φυτό, το Βόριο θα πρέπει να μετακινηθεί στη ριζική ζώνη με το νερό της βροχής ή με άρδευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΥΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 λίτρο (lt)

