MACROLIP 60

ΓΕΝΙΚΑ

- Το MACROLIP 60 είναι βασικό, διαφυλλικό λίπασμα για την πλήρη λίπανση των οπωροφόρων δένδρων, της αμπέλου, των λαχανικών, των μποστανικών, των μεγάλων καλλιεργειών, των καλλωπιστικών και των σπορείων.
- Τα εμπεριεχόμενα βασικά λιπαντικά στοιχεία του Αζώτου, Φωσφόρου και Καλίου, βρίσκονται σε ισορροπημένη αναλογία και πλήρως αφομοιώσιμη μορφή.
- Εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία, για ολοκληρωμένο λιπαντικό αποτέλεσμα.
- Πλήρως υδατοδιαλυτό, για άμεση μεγιστοποίηση της απορρόφησης και αφομοίωσης των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ	200 - 250 g / 100 lt νερού ή 200 - 250 g / στρέμμα	Οι ψεκασμοί αρχίζουν με την έναρξη της βλάστησης και επαναλαμβάνονται ανά 15 ημέρες για 3 φορές.
ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΙΑ ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ** ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ**		Οι ψεκασμοί αρχίζουν με την έναρξη της βλάστησης και επαναλαμβάνονται ανά 15 ημέρες για 3 φορές. Στην ακτινιδιά, οι ψεκασμοί αρχίζουν μετά το δέσιμο του καρπού και επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες.
ΕΛΙΑ **ΑΜΠΕΛΙ** **ΣΤΑΦΙΔΑ**		Οι ψεκασμοί αρχίζουν με την έναρξη της βλάστησης και επαναλαμβάνονται ανά 15 ημέρες για 3 φορές.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΙΤΗΡΑ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ, ΣΠΟΡΕΙΑ		Οι ψεκασμοί αρχίζουν μόλις μεγαλώσουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται 2 - 3 φορές κάθε 15 ημέρες. Για το καλαμπόκι, κρίσιμες είναι οι 60 πρώτες ημέρες.
ΚΑΠΝΑ		Η έναρξη των εφαρμογών πραγματοποιείται από το σπορείο και επαναλαμβάνουμε κάθε δέκα (10) ημέρες μετά τη μεταφύτευση.
ΜΠΟΣΤΑΝΙΚΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ		Η εφαρμογή αρχίζει μόλις αναπτυχθεί η βλάστηση και επαναλαμβάνεται δύο (2) φορές κάθε 15 ημέρες.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΜΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΣΑ ΜΠΙΖΕΛΙΑ		Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες για 2-3 φορές.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ		Οι εφαρμογές ξεκινάνε από τα σπορεία και συνεχίζονται μετά τη μεταφύτευση κάθε 15 ημέρες. Συνολικός αριθμός εφαρμογών: 3 - 4.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ **ΓΚΑΖΟΝ** **ΓΗΠΕΔΑ**		Έναρξη εφαρμογών τον Μάρτιο και επανάληψη ψεκασμού τρεις (3) φορές κάθε 15 ημέρες.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ - ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑΤΑ

Η γενική δόση είναι 250 - 300 g στα 100 λίτρα νερού.
Κατά τη μεταφύτευση λάχανων και κουνουπιδιών, η δόση εφαρμογής είναι 500 g στα 100 λίτρα νερού.
Κατά τη μεταφύτευση των καπνών, η δόση είναι 150 g στα 100 λίτρα νερού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η γενική δόση είναι 150 g / δένδρο.

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Η εφαρμοζόμενη δόση είναι 0,7 - 1,5 kg στα 1000 λίτρα νερού.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ

Εφαρμόζεται δόση 1 kg στα 1000 λίτρα νερού.

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τ.Θ. 1112 , 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

MADE TOV
ΕΣΥΦ

MACROLIP 60

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα.
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα ισχυρής αλκαλικής αντίδρασης (π.χ. βορδιγάλειο πολτό, θειασβέστιο) και δινιτρικά (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη).
Στην περίπτωση ανάμειξής του με άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν, το MACROLIP 60 θα πρέπει να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα πάντοτε τελευταίο.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό.
Να αποφεύγεται η υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων και οι ψεκασμοί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή σε ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του σε χώρο δροσερό, αποφεύγοντας την άμεση έκθεση του προϊόντος στο ηλιακό φως και την υγρασία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210 77 93 777

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

1203/72

MACROLIP 60

20 - 20 - 20 + 2 MgO + ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΗΡΕΣ, ΒΑΣΙΚΟ, ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 2003 / 2003 / ΕΚ)

MACROLIP 60

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΖΩΤΟ (N) 20%
Αμμωνιακό 4.7%
Νιτρικό 6.0%
Ουρικό 9.3%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P_2O_5) 20%
ΚΑΛΙΟ (K_2O) 20%
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO) 2%
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 0.1%
(συνολική περιεκτικότητα σε χηλική μορφή)
- Βόριο (B)
- Χαλκός (Cu)
- Σίδηρος (Fe)
- Μαγγάνιο (Mn)
- Μολυβδαίνιο (Mo)
- Ψευδάργυρος (Zn)

Υγρασία (H_2O) (max) **1%**
Ελεύθερο από Χλώριο (Cl)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά, με τους παρακάτω τρόπους:
- Διαφυλλικά με ψεκασμό.
- Απ' ευθείας προσθήκη στο έδαφος.
- Στάγδην άρδευση στα θερμοκήπια.
- Τεχνητή βροχή.
- Ριζοποτίσματα.

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 1 kg