

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφρώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Διάθεση του περιεχομένου | περιεκτική. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναιωσιζόμενα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς, να αφήσετε αβέβαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τα φυτά - μη στόχους, να αφήσετε αβέβαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• Εάν ζητήσετε **ιατρική συμβουλή**, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ:** Τοποθετήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  
210 7793777

### ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.



ΠΡΟΣΟΧΗ

# NICOSH 4 OD

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 4%

### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Nicosulfuron : 4,00% B/O

Βοηθητικές ουσίες: 95,52% B/B

ΕΛΑΙΩΔΕΣ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (OD)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ** • Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 1 - 3 φύλλα, 100 - 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 1 - 2 αδέλφια. • **Σετάρια** (Setaria spp.), 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή σε 2 - 4 φύλλα. • **Βέλιουρας** (Sorghum halepense), (α) Από σπόρο, (β) Από ρίζωμα, 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή μέχρι 8 φύλλα, 125 - 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 10 - 20 cm ύψος. **ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ** • **Βλήτα** (Amaranthus spp.), 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 2 - 4 φύλλα. • **Τάτουλας** (Datura stramonium), 100 - 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 2 - 4 φύλλα. **ΌΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 20 - 40 lt / στρέμμα. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** 1.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2 - 8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου.  
(2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1<sup>η</sup> εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα και 2<sup>η</sup> εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα.

## ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ &  
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΤΟ ΝICOSULFURON ΔΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ ALS, ΣΥΝΘΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΓΛΑΚΤΙΚΟΥ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθολικός, μεταφυτρωτικό ψεκασιός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με 20 - 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση μικρότερη των 2.5 atm και μπεκ τύπου ακούπας. • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. • **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δεν γίνει αυτό, ενδεχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες, στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο), μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: - Αδειάστε τελείως το βυτίο. - Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. - Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνιακής οξείκης χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος, «ψεκάροντας» υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να αδειάσει. Επανάληψτε την ανωτέρω διαδικασία προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. - Χρησιμοποιήστε το ίδιο διάλυμα για το ξεπλύμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ, τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1<sup>η</sup> - 2<sup>η</sup> εβδομάδα μετά την εφαρμογή, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν γλυρωμένες στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνέπεια της χρησιμοποιούμενης δόσης και είναι παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι, καθώς και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σπορά. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ** (ημέρες Αραβόσιτος: - **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση απουσίας της καλλιέργειας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το **NICOSH 4 OD**, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ενασπαρήσει μόνο αραβόσιτος. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και για σπορά προηγουμένως άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του **NICOSH 4 OD** και αφού προηγηθεί βαθιά άρσης. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. • **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. • **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Να μην πραγματοποιείται ψεκασιός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

### ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70060 | 4.12.2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: SHARDA EUROPE b.v.b.a.,

Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη ΕΠΕ,

Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι, τηλ. 210 6890144

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  
ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε  
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : συσκευασία  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βλέπε  
συσκευασία



**Agrotechnica**  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, FAX: 2310 797 263  
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



280316



twomatch!

SIZE: 267x130cm

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5.5 pt

CLP SIZE: 1.8x1.8 cm

COLOR CHANGE: 4 CMYK