

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μακριά από θηλαστικά / σπινθήρες / γυμνάς φλόγες / θερμές επιφάνειες, • Μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε ατμοσφαιρικούς ατμούς / εκπομπές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / εφαρμογή. • Περιέχει Pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αέραστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα με φυτική κάλυψη σε συνδυασμό με την χρήση ακροακίων μείωσης της διασποράς του φυτοφατικού νερού κατά 75%. • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αέραστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εθρήνητα δέρματος ή ακαθαρσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον πακέτο του προϊόντος ή την ετικέτα.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- Μην προκαλέσετε εμετό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα εργασίας πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ζητήστετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ' όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- Εάν δεν υπάρχουν ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΙΣΤΩΣΗΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε προξία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΑΣΕΩΝ**  
**210 7793777**



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣ ΕΥΦΛΕΚΤΑ**  
**ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΥΣΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ**  
**ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ**  
**ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΕΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ**  
**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων & αγρωστωδών ζιζανίων κατά το φύτεμα τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιμυλλικό κηρύσι. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει την λειτουργία της αμινοξέ με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσφαιρικών της ιαπωνικής αρακάς. Δρά δια επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιών οφθαλμών – φύλλων, που ακολουθεί το κορυφαίο των αμερικανικών κηρύσιων Μπέρλεϊ και Βιτζίνια. • **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσταπτικά με ενσωμάτωση, προσταπτικά επιφανειακά ή νωρίς μεταπρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή, αν δεν βρέξει μέσα σε 5-6 ημέρες, χρειάζεται πότισμα. Επίσης, εφαρμόζεται ως αντιμυλλικό κηρύσι φυλάσσοντας τα κορυφαία κηρύσια κηρύσιων. Χρησιμοποιείται μικτού τύπου σκευάσματος και φυλάσσεται με πίσω φυτοφατικού μικρότερη από 3-4 επιλογίες (45-60 Pch). • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΟΦΑΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Για το φυτοφατικό μέσο μέχρι τη μέση τη νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο φυτοφατικό δοχείο αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση. • **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΦΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του φυτοφακτικού με άφθονο καθαρό νερό. • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής στις συστάσεις καλλιέργειας. Άλλοι κίνδυνοι εδαφοχηματισμού συνθήκες με εδάφη στην περιοχή λήθραυ Ηρόσι και την περιοχή όπου Ραβέντα. • **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** α) Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειωνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. β) Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • **ΝΑ ΜΗΝ** εφαρμόζεται στην περιοχή λήθραυ Ηρόσι και στην περιοχή όπου Ραβέντα. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Κανονικές περιπτώσεις. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλα καλλιεργητικά εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν 63 μέρες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΤΕΙΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΕΙΡ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το φυτοφατικό υγρό. • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Το κατά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φυτοφατικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίπτυχο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείσονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Κάρφια: 90, Σπέρνιξη: 28, Μπαρούλι: 75. **Υπόλοιποι καλλιέργειας του φυτοφακτικού:** Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής. • **ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική απαριθμηση συσκευασίας του, σε μέρος όπου, προσοχή και καλά περιγράψονται, μακριά από θερμάσια ή πηγές αναρρέας παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

# PENCOT 33 EC

Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) 33%

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**  
 Pendimethalin : 33.00 % B/O  
 (Χημική ομάδα: Δινιτροανιλίνη)  
**Βοηθητικές ουσίες:** 62.65 % B/B  
 Περιέχει αρωματικό διαλύτη (νάφθα)

**ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

## ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ & ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 70111 / 25.02.2015**  
**ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΤΗΣ: SHARDA EUROPE b.v.b.a., Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο, Τηλ. + 32 2 767 7960.**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ : SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,**  
 Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι.  
**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ**

**ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ**  
  
**ΕΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ**

**Agrotechnica**  
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263  
 info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι ΣΤΟΧΟΙ Ι ΔΟΣΕΙΣ Ι ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΚΑΡΟΤΟ, ΑΡΑΚΑΣ, ΟΣΠΡΙΑ (ΡΕΒΥΘΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ), ΠΑΤΑΤΑ, ΣΠΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Προπρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).  
**ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΣΚΟΡΔΟ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Νωρίς μεταπρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μασπίου).  
**ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΡΑΔΙΚΙ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Πριν τη μεταφύτευση.  
**ΣΠΑΡΤΙΤΕ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 500-600 κ.εκ./στρέμμα. Προπρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σομαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό, β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σομαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου.  
**ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων.  
**ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΟΓΙΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΑΡΑΧΙΔΑ:** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Προσταπτικά με ενσωμάτωση ή προπρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά).  
**ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο):** Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Πριν ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράγωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών.  
**ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιμυλλικό των Αμερικανικών κηρύσιων Μπέρλεϊ και Βιτζίνια):** Για παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλιών οφθαλμών-φύλλων με 400 κ.εκ./στρέμμα. Στις αρχές της πλήρους άνθησης, αφού κορρολογηθούν τα κηρύσινα αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ. εκ. ψ.μ./φυτό, διαλύματος 10 κ. εκ. προϊόντος ανά λίτρο. **Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 20-50. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.  
**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:**  
**\*Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:**  
**Ευαίσθητα Ζιζάνια:** Βέλιουρος από σπόρο (Sorghum halpense), Μίλιο (Millium sp.), Φεστούικα (Festuca sp.), Κεχρί (Panicum sp.), Ελευσίνη (Elyusine indica), Ηρα (Lolium multiflorum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αλεπανούρα (Alopecurus myosuroides), Κοπή τσίρα (Poa annua), Ανεμώνιστρα (Apera spica-venti), Νεραργαδία (Paspalum paspalodes), Φάληρα (Phalaris sp.), Σετάρια (Setaria spp.).  
**Ετήσια Πλατύφυλλα Ζιζάνια:**  
**Ευαίσθητα Ζιζάνια:** Στύλιος (Solanum nigrum), Βλήτο (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Άνηθμος (Anethemum sp.), Μαργαρίτα (Chresanthemum sp.), Ζυγός (Sonchus oleraceus), Αγριοκαρόδιουδα (Lepidium draba), Οξάλιδα (Oxalis pesicarpa), Παπαρόνια κοινή (Papaver rhoeas), Πολύγωνο (Bickleria convolvulus), Περιοκίδα ετήσια (Convolvulus avensis), Γκόλιο (Galium aparine), Βερόνικα (Veronica sp.), Τσουκνίδα (Urtica sp.), Αγριοπτεριά (Polygonum persicaria), Adonis spp.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**  
 Δεν επηρεάζεται η συγκομιδή αμπελοφύλων που προέρχονται από αμπελώνες, στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Pencot 33 EC**.  
 Α. Η δράση του **Pencot 33 EC** στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24 – 48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.  
 Β. Στο θαμνιάκι, μετά την προσταπτική εφαρμογή με ενσωμάτωση, συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μεταπρωτικά, προπρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο, που περιέχει τη δραστική ουσία **Fluometolam** στη δόση 250 κ.εκ./στρέμμα (σκέυασμα 50% περιεκτικότητας σε δραστικό) ή 125 κ.εκ. δραστική ουσία / στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του Στύλιου (Solanum nigrum).  
 Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη – χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή / και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις και ανάλογα με τη σύσταση / γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί παροδική καθυστερημένη ανάπτυξη των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή / και χαμηλών θερμοκρασιών.  
 Δ. Το **Pencot 33 EC** καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βλασκοντα σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα – κοτυληδόνες). Εφ' όσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια, θα πρέπει προηγούμενα να καταστραφούν με σκόλομο ή βοτάνομα ή με κατάλληλο μεταπρωτικό ζιζανιοκτόνο.  
 Ε. Μην εφαρμόζεται το **Pencot 33 EC** σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



220317

**ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :** Βλέπε  
**ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΗΣ :** συσκευασία  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (lt)**

**twomatch!**  
 visual communication services

**SIZE: 267x130**

**COLORS: CMYK**

**MIN FONT SIZE: 5 pt**

**CLP SIZE: 1,4x1,4cm**

**COLOR CHANGE: 4 CMYK**