

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΣ

- Μακριά από παιδιά. • Μακριά από θερμήτρα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, Μην καπνίζετε. • Μην τρίψτε, η καρπίζετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Η χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό καλά αερίσμενο χώρο. • Να φορτίσετε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένα. • Φορτίστε κατάληξη μπύτες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής*. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάληξη προστατευτική ενιά μασά και γάντια εφόσον επειδήν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό*. • Μην ρυπανείτε το νερό με το προϊόν ή τη σουσκευα του. • Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφρίστε μια αιχματούχη λόγη προσπολοής από τα επιφανειακά υδάτα 30 μέτρων ή 5 μέτρων με ακρορύπαυτα μειωμένης διασποράς 50% για το απέλευθερωμένο, 30 μέτρων για τα καλλυντικά με μήκος μικρότερο από 50 εκ., 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ακρορύπαυτα μειωμένης διασποράς 50% για τη μποτιά που πατάτα, τα ψωμάτινα, τα καρποφόρα λαχανικά, τον απαντό, τα χαροπατεύτα, τα κτηνοτροφικά τεύχα, τα σπαρανθή, τα ρύζιματα λαχανικά, τα βαλβάρη λαχανικά, την αγκούρα και τα καλλυντικά πόνια από 50 εκ.. • Για να προστατεύετε μη στοχευμένα αρθρόδοτα να αφρίστε μια αιχματούχη λόγη προσπολοής 5 μέτρων από την μη γεωργική γη για το αγρότη και τα καλλυντικά πόνια από 50 εκ.. • Επιτέλυντο για την μέλισσα. Για να προστατεύετε τις μελισσές και όλα έντονα - επικονιωτές να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλυντικές κατά την ανθοφορία ή κατά τη περίοδο ανθοφορίας ζάχαρων. Απομακρύνετε τα ζάχαρα πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες αυλεγούν. Η εφαρμογή πρέπει να προμητοποιείται μετα την άρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να περιστένουν στη κομέλη για 1 μέρα εξαφαλίζοντας τροφή και νερό. • Για να απορύγετε τους κινόνες για την ανθρώπινη γένετα και το περιβάλλον, ακολουθήστε τη δόνησης χρήσης.

ΠΡΙΟΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικό: Σε περιπτώση πτυχήσματος ή αν αιθανθείται αιθαντικά (ήπιτες αμέσως πτυχή ή παραπομπή διελέγεται την επέκτη αν έναι διντο). • Σε περιπτώση επορίας με το δέρμα (ή με το μαλλί): Αφαρίστε αμέσως όλα τα μαλισκαντικά ενδύματα. Επιτέλυντε το δέρμα με νερό στο ίσο τους. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΕΠΟΡΙΑΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΙΟ: Δύνατε το στοιχίο (ύποντας σε αργότερη εργασία της μελισσής του), ΜΗΝ τραβάσετε εμπότι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και διελέγετε την επέκτη αν έναι διντονότ.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυντείτε με σέρφων νερό την απόστρωση. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιτέλυντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φυσικές επορίες αφρίστε τους, εφόσον ενοιαστείτε ότι ενοιαστείτε. Συνεχίζετε την επέκτη αν έναι διντονότ. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΠΥΡΑΝΤΟΣ: Απομακρύνετε τον ποδιόνα του καθέρο αέρα και αφρίστε τον να ξέκουστεται στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χρηγείστε οδύνημα. Σε περιπτώση ακανονίστιας αναπνοής ή διακοπής αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. • Σε περιπτώση πυροβολίας ή σύν η συμπτωματική θεραπεία. Ανατρέψτε την καρπή βρήκεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπληκτική θεραπεία.
THA. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210 77 93777

- ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ ΕΥΦΕΚΤΑ. • ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΝ ΚΑΙ ΔΙΕΣΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΤΕΥΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ. • ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΨΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. • ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΩΒΑΡΗ ΘΩΦΑΙΜΗ ΒΑΘΗ. • ΕΠΙΒΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΝ ΕΦΕΤΗΝΟΣ. • ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΨΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. • ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΓΗΑ Ή ΖΑΗΝ. • ΠΟΥΣ ΤΟΣΚΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
500 ml (cc)

two match!
SIZE:200x104
COLORS: orange
MIN FONT SIZE: 5 pt
CLP SIZE: 1.5x1.5 cm
COLOR CHANGE: -

GEOTHRIN MAX 50 EC

Cypermethrin (Συπερμεθρίν) 50%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Cypermethrin : 50.00% B/O
Βοηθητικές Ουσίες: 48.40% B/B

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

ΠΥΡΕΩΡΙΝΟΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΔΡΑ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑ ΤΟ ΚΑΕΩΣΙΜΟ ΤΟΝ ΔΙΑΥΔΩΝ ΝΑ+ ΣΤΟΣΥΣ ΝΕΥΡΑΞΟΝΕΣ ΤΟΝ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΝ, ΑΥΤΟ ΕΚΕΙΣ ΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΝΕΥΡΟΜΥΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗ, ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΣΚΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΠΡΟΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 14437/15.5.2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL, Rue de Renoy 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Πρόεδροιου 16, Καλαόρα, Τ.Κ. 15233 Αθήνα, τηλ.: 210 5578777
ΕΡΓΟΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA ΟΒΕΕ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΒΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu (AMEA)



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΔΙ ΟΙΚΗΣ

- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι ΣΤΟΧΟΙ Ι ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ι ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ**
- **ΑΜΠΕΛΙ** (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΜΟ): Κοχυλιά, Ευθεμίδα, Τάτζκάια, Ταγιαρόλογος, Πυραλέα: 4-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 20-150 λτρ./στρ. (παχ 6 κ.εκ./στρ.). • **ΠΑΤΑΤΑ:** Αριδές, Δορυφόρος, Φθοριμαία: 8-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λτρ./στρ. (παχ 8-10 κ.εκ./στρ.). • **ΑΙΓΑΙΝΑ ΡΑΓΙ:** Λεπτοπότερα Αρίδες: 10-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΣΚΟΡΔΑ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΟ:** Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς, Αρίδες, Άλευρώδης, Δορυφόρος, *Diabrotica* sp., Τάτζκάια: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΠΕΠΩΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΤΑΙΓΑΡΟΥΟΥ):** Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς, Αρίδες, Άλευρώδης, Δορυφόρος, *Diabrotica* sp., Τάτζκάια: 10-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΝΤΖΑΝΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς, Αρίδες, Άλευρώδης, Δορυφόρος, *Diabrotica* sp., Τάτζκάια: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΜΠΙΖΕΝ ΜΕ ΛΟΒΟ, ΦΑΣΩΝΙ ΜΕ ΛΟΒΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Θρίτες, Στινάτη, Αριδές, Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς, Αρίδες, Άλευρώδης, Θρίτες, Άλευρώδης, Δορυφόρος, *Diabrotica* sp., Τάτζκάια: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΑ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ:** Άλτης, Δορυφόρος, Άλευρώδης, *Diabrotica* sp., Τάτζκάια, Θρίτες, Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΣΙΝΑΤΗ:** Άλτης, Δορυφόρος, Άλευρώδης, Θρίτες, Αρίδες, Άλευρώδης, Καστίδα, Πράσινο σκουλήκι, Τριχοπλούσα, *Euxoa ochrogaster*, *E. scandens*, *E. tessellata*, Αγρόποδη καραφατάς, Στοντόπετρα, Φθοριμαία: 10-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΚΑΡΩΤΑ ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ, ΡΑΠΑΝΙ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ** (*Scorzonera*): Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΣΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΙΡΙΩΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΟΥΛΥΡΑ (*Triticum spelta*):** Αριδές, Αγρόποδη καραφατάς, *Spelaria* sp., *Oulema* sp., Κριόδεια: 10-65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 15-50 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΜΗΔΙΚΗ:** Άλευρώδης, *Colaspis elutina*, Φυτούνιος, Αριδές, Θρίτες, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Αγρόποδη καραφατάς, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Αγρόποδη, Στοντόπετρα, Άλευρώδης, Θρίτες, Αρίδες, Άλευρώδης, Καστίδα, Πράσινο σκουλήκι, Τριχοπλούσα, *Euxoa ochrogaster*, *E. scandens*, *E. tessellata*, Αγρόποδη καραφατάς, Στοντόπετρα, Φθοριμαία: 10-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΒΑΜΒΑΚΙ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕΣΚΟΥΛΑ, ΓΟΥΛΙ, ΡΕΒΑ, ΚΑΡΟΤΟ, ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ, ΡΑΠΑΝΙ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ** (*Scorzonera*): Πράσινο σκουλήκι, Στοντόπετρα, Φθοριμαία, Πειρίδα, Πλουτέλα, Μαύεστρα, *Autographa* sp., Αγρόποδη καραφατάς: 10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΣΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΙΡΙΩΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΟΥΛΥΡΑ (*Triticum spelta*):** Αριδές, Αγρόποδη καραφατάς, *Spelaria* sp., *Oulema* sp., Κριόδεια: 10-65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 15-50 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΔΑ ΣΤΗ ΦΥΤΟΡΙΑ:** Αριδές, *Spergula canescens*, *Cryptanthus laevis*: 10 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΚΑΠΝΟΣ:** Καστίδα, Αριδές, Άλευρώδης, Θρίτες, Πράσινο σκουλήκι, Τριχοπλούσα, *Euxoa ochrogaster*, *E. scandens*, *E. tessellata*, Αγρόποδη καραφατάς, Στοντόπετρα, Φθοριμαία: 6-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). • **ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΡΙΑ:** *Lymnaea dispar*: 4 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με δύο ψεκ. υγρού 200-250 λτρ./στρ. (παχ 10 κ.εκ./στρ.). **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ:** Εισαρωτής, Καρπούζι, Καρπούζι (Y), Τομάτα (Y), Μεντζανά (Y), Μπιζέν με λοβο (Y), Φασούνι με λοβο (Y), Κούνουπιδα, Μπροκόλο, Λαχανό, Βαμβακί, Ζαχαροτεύτλα, Σεσκούλα, Γούλι, Ρεβά, Καρότο, Ραπανόσελινο, Ραπανί, Παστινάκη, Ριζές Μαϊντανού Λαγοχόρτο (Scorzonera), Μηδική, Καλλωπιστικά φυτά, Δασικά ειδη: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον αποτελείται. • **ΣΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΙΡΙΩΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΟΥΛΥΡΑ (*Triticum spelta*):** Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον αποτελείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοιόμορφος ψεκασμός. • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συμπιεσμένη δόση του σκευασμάτος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. • **ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗΤΟΝΤΑ:** Δεν συνδύασται με ενώσεις που προκαλούν αλκαλική αντίδροση. • **ΔΑΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΡΥΠΑΤΑΣΤΥΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΓΑΣΙΑΣ:** Ως φιλές και στα δοχεία που έχουν παρασκευαστεί με την ομώνυμη δόση, θα πρέπει να απορρίψουμε την έντονη αντίδροση που προκαλείται από την αντίδροση της αλκαλικής αντίδροσης με την αντίδροση της αλκαλικής αντίδροσης. • **ΕΙΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΣΣΕΣ ΦΥΤΟΥΤΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΙΣΕΤΕ:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την άνθιση ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζάνινων. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται αργά το απόγειόν μας (μετά την άριστη συλλογή των ρεμποτών). • **ΔΙΑΛΕΞΗΡΙΔΑ ΑΝΟΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών λεβδών ώστε να περιορίζεται η πληθυσμός των εντονών και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες περιοχές. Εφαρμογές, μόνο σταν ενιαία απορρίπτεται με βάση τα πλέον υφιστάμενα οριά οικονομικής ημέρας και με τρόπο ώστε να μειωθείται ο κινδύνος για τη φωλιά μαρθρόποδα. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πλέον υφιστάμενα οριά οικονομικής ημέρας και στην πλευρά της αντίδροσης της αλκαλικής αντίδροσης με την αντίδροση της αλκαλικής αντίδροσης. • **ΜΕΤΣΩΣΗΣ ΑΠΡΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** Απλέλι Επιτραπέζιο & Οινοποιησμό. • **Εισαρωτής, Καρπούζι, Καρπούζι (Y), Τομάτα (Y), Μεντζανά (Y), Μπιζέν με λοβο (Y), Φασούνι με λοβο (Y), Κούνουπιδα, Ζαχαροτεύτλα, Σεσκούλα, Γούλι, Ρεβά, Καρότο, Ραπανόσελινο, Ραπανί, Παστινάκη, Ριζές Μαϊντανού Λαγοχόρτο (Scorzonera), Μηδική, Καλλωπιστικά φυτά, Δασικά ειδη:** Μετρός μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον αποτελείται. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΑΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΣ (ΗΜΕΡΕΣ):** Σταρι, Σικαλη, Κιριωαρι, Βρωμη, Ουλυρα (spela): 28. Απλέλι Ελαιοκραμβή, Σινατη: 21. Ζαχαροτεύτλα, Καρπούζι Κατεύτλα, Σεσκούλα, Γούλι, Καρπούζι (Y), Καρπούζι (Y), Τομάτα (Y), Μεντζανά (Y), Μπιζέν με λοβο (Y), Φασούνι με λοβο (Y), Κούνουπιδα, Ζαχαροτεύτλα, Σεσκούλα, Γούλι, Ρεβά, Γούλι, Καρπούζι: 14. Μηδική: 7. Υπολόπες Ελαδίμες Καλλιέργειες: 3. Καλλωπιστικά φυτά, Δασικά ειδη: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΟ. • **ΣΤΟΚΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΗΤΑΣ, ΕΥΑΣΘΕΝΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΕ ΤΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παραγωγής με ευασθενίας ποικιλίων και δόσεις φαρασεύεται, στην αρχή του συσκευασμάτων, σε χώρο έτρων, δροσερό, και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

110320



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΙΜΕΣ : ουσιευσσία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : 10