

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Γλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήθει ερεθίσματος του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε Ι Επισκεφθείτε γιατρό.
  - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το σώμα.
  - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε Ι Επισκεφθείτε γιατρό.
  - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:**  
210 77 93 777

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ,  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΕΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 5-CHLORINE-2-METHYL-2H-ISOTYAZOL-3-ONE.  
ΥΠΟΠΟΤΟ ΠΑ ΓΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΠΙΝΟΥ.

ΥΠΟΠΟΤΟ ΠΑ ΓΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην το χρησιμοποιείτε πριν διδάσκετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Απορεύετε να ανανέψετε συγκεντρώσεις στραγγονίδων ή εκνεφύλια. • Ι λύνετε τα χεριά σχολαστικά μετα το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια ή προστατευτικά ενδύματα ή μέσα απομάκρυνσης για την τελική διαθεση στην αγορά ή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AGROTECHNICA OBEΕ

16912

ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,  
ΑΚΟΛΟΥΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΗΣΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε  
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Φιάλη  
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 ml (cc)

# AZOCIP SC

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Azoxystrobin : 20.00% B/O  
Cyperconazole : 8.00% B/O  
Βοηθητικές ουσίες: 73.90% B/B

## ΠΥΚΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
		κ.εκ./στρέμμα	100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Σπάρι (TRIZA) Βρώμη (ΑΝΕΣΑ) Σίκαλη (SECCE) Triticale (ITTLRI)	Σεπτορίωση (Septoria spp. - SEPTSP)	80 - 100		10 - 40	Προϊστηματικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. 1 <sup>η</sup> εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου, μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φύλλου σηματία. 2 <sup>η</sup> εφαρμογή πριν την αρχή της ανθησης.	2 / 21

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

## ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60639 | 28.07.2017

ΚΑΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no.3, 12<sup>th</sup> Floor, 30006 Murcia, Ισπανία  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ι  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AGROTECHNICA OBEΕ



**Agrotechnica**  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Φ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263  
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Διασυστηματικό μυκητοκτόνο, μήγανο δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin, μυκητοκτόνο με αντιστορογόνο δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και από το φύλλωμα των καλλιεργειών και αναστέλλει την μεταχονδρία αναπονή, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και της παραγωγής σπορών, καθώς και την αναστολή ανάπτυξης μικτήλου του μυκτήλου.
- ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί καλύμβεων φυλλώματος.
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φάλη και προσθέστε τη συνιστώντα δόση στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΣΘΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ:** Το σκεύασμα δεν ένια φυτοτοξικό στις συντακτικές καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
- ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΜΟΠΙΚΕΣ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Τηρείτε το μεγαλύτερο αριθμό φραγμών δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. Αποφεύγετε τις συνεχήμενες φραγμούς στους κατερρευτικούς τρόπους δράσης.
- ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνωθεί το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύτα.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΌΤΑΝ ΠΡΟΚΕΤΑΙ ΠΑ ΜΕΤΑΣΥΛΕΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΗΜΕΡΕΣ):** Σπάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτκάλε: 42.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βιτρίνα. Ξεπλύνετε το βιτρίνο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρέσα (3) φορές με καθαρό νερό.
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΔΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας έριπλένονται υπό πίεση με θεικό εξόπλισμο ή γινεται τριπλό έριπλιμα (τα νέρα του έριπλιματος τα ρίγουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφύονται κατεστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιπέτερω χρήσης, να εναποτελούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάτιτη ενέργειας.
- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο έρημο, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

two match!

visual communication services

SIZE: 267x130

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5 pt

CLP SIZE: 2.1x2.1 cm

COLOR CHANGE: