BRAI 10 EC

PYRIPROXYFEN 10% (ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Pyriproxyfen : 10.00 % Β/Ο
Βοηθητικές ουσίες: 88.97 % Β/Β

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΙΜΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 14538/25.09.2015

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: LAINCO S.A.,
Pol. Ind. Can Jardi, Avda. Bizet, 8-12 08191 Rubi, Barcelona, Ισπανία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.,
Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα, Τηλ: 210 72 36 700
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA ΟΒΕΕ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 266, 797 268, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ. (ml)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Prod. Date) :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Lot. No) :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • [illegible] **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** [illegible] **ΜΗΛΟΕΙΔΗ | ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ | ΑΚΡΟΔΡΥΑ** [illegible] **ΕΛΙΑ** [illegible] Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777**

• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ.
• ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. • ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. • ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.
• ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

•**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά προτίμηση [illegible] •**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** [illegible] •**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** [illegible] •**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** [illegible] •**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** [illegible] •**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. •**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** [illegible] • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** [illegible] •**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ): ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΛΑΙΜ, ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ):** 30, **ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ, ΛΩΤΟΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΕΛΙΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΕΥΚΑ:** Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής, **ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ):** 3. •**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ [ΧΡΟΝΟΣ] ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** [illegible]

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΛΑΙΜ):** Για Κοκκοειδή, Κόκκινη Ψώρα, Ασπιδιωτός, Λεκάνιο, Μυτιλόμορφη Ψώρα, Παρλατόρια με **δόση** 50 – 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 – 150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή. • **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (*ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ*: ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ*, ΦΙΣΤΙΚΙΑ*, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ*, ΚΑΡΥΔΙΑ*, ΚΑΣΤΑΝΙΑ*):** Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ με **δόση** 40 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 70 – 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. • **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, *ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ*: ΚΥΔΩΝΙΑ*, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ*, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ*):** Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ με **δόση** 40 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 70 – 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. Για *Pseudaulacaspis pentagona* η **δόση** είναι 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 80 – 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. • **ΛΩΤΟΣ* (*ΧΡΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ*):** Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ με **δόση** 40 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 70 – 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. • **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΙΑ):** Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ με **δόση** 40 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 70 – 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. Για *Pseudaulacaspis pentagona* η **δόση** είναι 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 80 – 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση. • **ΕΛΙΑ:** Για Λεκάνιο με **δόση** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 – 125 λίτρα/στρέμμα. Πριν την άνθηση και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς[1]. 1 εφαρμογή. • **ΤΟΜΑΤΑ (Θ):** Για Αλευρώδεις με **δόση** 50 – 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 - 150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[1]. 2 εφαρμογές ανά 10 ημέρες. • **ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ):** Για Αλευρώδεις με **δόση** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 – 150 λίτρα/στρέμμα με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[1]. 2 εφαρμογές[4]. • **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ*) (*ΧΡΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ*):** Για Αλευρώδεις με **δόση** 50 – 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 100 – 150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[1]. 2 εφαρμογές ανά 10 ημέρες. • **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Για Αλευρώδεις με **δόση** 50 κ.εκ./στρέμμα. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** 40 – 80 λίτρα/στρέμμα. Πριν το άνοιγμα των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 1 εφαρμογή. • **ΠΕΥΚΑ** [5] **(Αστικών και Περιαστικών περιοχών):** Για *Marchalina hellenica* με **δόση** 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Καλή διαβροχή όταν έχει εκκολαφθεί το 70 – 75% των νυμφών (έρπουσων) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών[5]. 1 εφαρμογή με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το **BRAI 10 EC.**
2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Μουσμουλιά, Λωτός και Μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»
3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Prays oleae*.
4. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
5. Για τη χρήση σε Πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:

• Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.
• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ:** Ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchalina hellenica* μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου. • **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ:** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών. Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον. • **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό. Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων. Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchalina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται: **Α.** Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του. **Β.** Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ.) με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπευθύνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

151020

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ