

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια ή προστατευτικά ενδύματα ή μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή πρόσωπο. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα ή μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμειξη ή φόρτωση και προστατευτικό ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισοδού μετά τον ψεκασμό, οι εργαζόμενοι πρέπει να φοράνε μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. • Διαβάστε περιεχόμενο ή περιεκτική σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική ανάσχεση, 10 μέτρων από επιφανειακά νερά, σε χειμερινά σπύρα. • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διαφοράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διαφοράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%. Δεν απαιτείται αβέκαστη ζώνη προστασίας όταν ψεκάζετε με ακροφύσια μείωσης της διαφοράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόμα. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε ή Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάθοντα, στον καθαρό αέρα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ
- ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

EMCEE 750 SL

MCRA 75%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

MCRA οξύ : 75,00 % B/O
(Υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85 % B/O)
ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Φαινοξυαλκανοϊκών
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 20,60 % B/B

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΞΥΑΛΚΑΝΟΪΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΣΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70358 | 06.11.2019

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: SHARDA CROPCHEM ESPANA S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina No 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
Τηλ.: +34 868127589, e-mail: e.nieto@shardaintl.com, regn@shardaintl.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 6946144719
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ

180521

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

50
ΧΡΟΝΙΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: συσκευασία
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: συσκευασία



ΚΑΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 λίτρο (lt)

ΠΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΑΡΙΑ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ): Πλατύφυλλα Ζιζάνια με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται μεταφωτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (αρχή καλαμώματος) έως το στάδιο του φύλλου σημεία (BBCH 31-39).

ΑΝΟΙΣΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΑΡΙΑ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ): Πλατύφυλλα Ζιζάνια με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται ναυρίς μεταφωτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου (αρχή καλαμώματος) (BBCH 13-32).

ΟΤΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα.
ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 - 30 εκ. ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
 2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.
 4. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C.
 5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί, ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημίες κ.α.
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: ΕΥΔΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Αναγούλιδα (*Anagallis arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κενταύρια (*Centaurea cyanus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κολλιτσίδα μεγαλόκαρτη (*Galium aparine*), Γεράνι (*Geranium dissectum*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Λάμιο (*Lamium spp.*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Λάπαθο (*Rumex sp.*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Ζυχός (*Sonchus arvensis*), Σπέρνυλλα (*Spergula arvensis*), Στελλάρινα (*Stellaria media*), Βερώνικες (*Veronica spp.*), Ριδολλία σεσέτιμ (*Ridolfia segetum*). **ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΔΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Καρδαμίνια (*Cardamine hirsuta*), Κεράσιτο (*Cerastium spp.*), Κίριο (*Cirsium arvense*), Πικρίς (*Picris/Helminthotheca echioides*), Πολυκόμμη (*Polygonum aviculare*).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπύκνωσης και αποπύκνωσης και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιπασία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών. • **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοιομορφος, μεταφωτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκουπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 PSI). • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. • **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΔΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΑΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. • **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίησετε, ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο, καθαρό νερό. • **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΣΠΕΥΔΕΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΠΤΕ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΣΘΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιερητικά μέτρα κλπ) όπου αυτο είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άρση να μην καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως Τομάτα, Τσίλια, Βαμβάκι. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΜΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Δεν ορίζεται. Καλιπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή. • **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

twomatch!

visual communication services

SIZE: 267x130

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5 pt

CLP SIZE: 1,7x1,7 cm

COLOR CHANGE: 4