

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλεδωνών. • Διάθεση του περιεχομένου | περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μήν γράψε, μήν πίνετε, μήν καπνίζετε δύο χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μη φοράτε προστευτικά γάντια, | προστευτικά ενδύματα. • Μη ρυπαντείτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε αιφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα επιφανειακά υδάτα. • Για να προστατέψετε τα φυτά - μη στόχους, να αφήσετε αιφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Εάν έπιπτετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας, τον περίεκτη του προϊόντος ή την επικάστη.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΓΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρουχά αμέσως και πλύνετε κατά τα προσβέβλημένα μέρη του σώματος με αφόνο νερό και σπόντο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΓΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με αφόνο νερό για σεκετά λεπτά και αυξιώστετε την οφθαλμίατρο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δογιό ή την επικάστη. Να μην προκλήσει εμετός.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΝΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζευτό και σε αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει εθικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΩΡΩΠΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΗΜΕΣ: ουσικευσία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ουσικευσία

WINNER 4 OD

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 4%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Nicosulfuron : 4.00% B/O
Βοηθητικές ουσίες: 95.50% B/B

ΕΛΑΙΟΔΕΣ ΕΝΑΙΟΡΗΜΑ (OD)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ZIZANIOKTONO

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ &
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΤΟ NICOSULFURON ΔΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ENZYMO ALS,
ΣΥΝΘΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70025/8.2.2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ASCENZA AGRO S.A., Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA
Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
AGROTECHNICA OBEΕ

50
1969 ΧΡΟΝΙΑ 2019
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu



ΕΞΥΠΦ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ • Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 1 - 3 φύλλα, 100 – 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 1 - 2 αδέλφια. • Σετάρια (*Setaria spp.*), 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή σε 2 - 4 φύλλα. • Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), (a) Από απόρο, 100 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή μέχρι 8 φύλλα, (B) Από ριζώμα, 125 – 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 10 – 20 cm ύψος. • Τάτουλας (*Datura stramonium*), 100 – 150 κ. εκ. / στρέμμα για εφαρμογή όταν έχουμε 2 - 4 φύλλα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2 – 8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου.

(2) 'Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1^η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα και 2^η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθολικός, μεταφυτωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη των 2,5 atm με τα συνήρη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μικρή τη μέση και προσθέτουμε διαδεύνοντας την συνιστώντας δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. • **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Ξεπλύνετε καλά τη ψεκαστικά μέσο. Αν δεν γίνεται αυτό, ενδέκαται να προκληθούν ζημιές στης καλλιέργειας, στης οποίας θα χρηματοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμυγδαλιού διάλματος 3% (1 λίτρο ανά εκατότριπτο), μερικός στου απαρακυθύνου όλα τα κεφαλάρια του σκευάσματος. Τα σταύλα καθαρισμού, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα εξής: Αδειάστε τελείως το βιτόνι με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. Ξαναγείστε το βιτόνι με καθαρό νερό μετά από την απομάκρυνση της δόσης υγρασίας σε διάφορα οικακής χρήσης 3% ανά 100λίτρο. Κυλόφροτητας το διάλυμα από μέσο όλου του συστήματος. Ιεκάζοντας υπό συνεχή ανάδευση μέριο να αδειάσει. Επαναλάβετε την αντιστροφή διαδίλλιμα για το ξέπλυμα δύο φύλλων των φύλτρων και των μπεκ, τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν να μη χρηματοποιείται όταν ο αραβοσίτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε δερματοκρασίες πάνω από 25°C και κάτια από 10°C. Κατά την 1^η-2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή, είναι δυνατόν να παρατηθούν υλοποιήσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαίνομενο αυτό είναι συναρπάτη της χρηματοποιημένης δόσης και εντα παρούσα. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή της απόδοσης, δεν μπορεί να χρηματοποιηθεί σε γιγαντιαία καλλιέργεια, καθώς και αριθμός που προσερίζεται για όποια.

• **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΔΗ (ημέρες):** Αραβοσίτος - **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε τερπίτων αποτύχιας της καλλιέργειας, στην οποία χρηματοποιήθηκε το WINNER 4 OD, στον ίδιο αγρό κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να εναντιστηθεί μόνο αραβοσίτος. • **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ** Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Για σπόρα χειμερινού σταύρου πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και για απόρρητη αποιεισθήση όλα τα καλλιέργειες την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά από την εφαρμογή του WINNER 4 OD) και αφού προηγηθεί βαθιό άρωμα. • **ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρκική, κλειστή συσκευασία του, σε έρη, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνήθεις παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγράφουμενη πημεριγμένη παρασκευής. • **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΕΩΓΡΙΚΕΣ ΦΥΤΟΥΤΕΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΛΕΙΤΕΣΤΕ:** Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εναντιμέντα βροχή στις επομένες 6 ώρες. • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό έξτηλμα (τα νέρα του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούμενο προηγουμένως με τρύπημα, για τη διαφύλαξη της μη περαστέωρ χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

031220

twomatch!
SIZE: 267x130cm
COLORS: CMYK
MIN FONT SIZE: 5.5 pt
CLP SIZE: 1.8x1.8 cm
COLOR CHANGE: 4 CMYK