ZED BF Next WaxBlock

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Brodifacoum : 0.0025% B/B
Βοηθητικές Ουσίες : 99.9974% B/B

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ, ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΗΡΩΔΕΙΣ ΚΥΒΟΥΣ (RB), ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ (MUS MUSCULUS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΦΕ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ (RATTUS NORVEGICUS) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΦΕ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ (RATTUS NORVEGICUS) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΙΚΡΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ: DENATONIUM BENZOATE
ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102: Μακριά από παιδιά. P301+P310: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου Ι περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

• Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Φοράτε προστατευτικά γάντια. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παραστάτμονες (π.χ. άτομα που διμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών -σύμφωνα με τον κηρύσσοντα κώδικα ορθής πρακτικής εαν υπάρχει». • Γιά να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζήτησε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). • Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. • Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ώς μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών. • Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικετα καθή φύλλο οδηγών χρήσης) θα πρέπει να αναγραφουν σαφως ότι δεν επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος στο ευρύ κοινό, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, οι χρήστες πρέπει να επισημανουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος. • Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικων θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερων. • Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικετα καθή φύλλο οδηγών χρήσης) θα συνιστουν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομοποιών-μυοκτονιών. • Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογων. • Απορρίπτε τα νεκρά τρωκτικά συμφωνα με τις τοπικές απαιτησεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: • Οταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: • Μην τοποθετείτε τα δολώματα απευθείας μέσα στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά. Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμους κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυακια, σχετοι νερού, χαντακια, αυλακια άρδευσης) η συστηματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΙΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ: Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον: Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: • Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στά σώλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

• **Σε περίπτωση δερματικής έκθεσης**, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. • **Σε περίπτωση Οφθαλμικής έκθεσης**, ξεπλύνετε τα μάτια με υηρό έκπλυσης μπιων ή ρηχέτο νερό, κρατήστε τα βλεφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. • **Σε περίπτωση σπανιότερης έκθεσης**, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Πιστέ μη χορηγείτε σπιθήριτε δια του στόματος σε ενα αναίσθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. • **Σε περίπτωση κατάποσης**, συμβουλεύετέ αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικετα του προϊόντος. • **Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο**, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. Οι δολωματικοι σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «δραστική(-ές) ουσία(-ές)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων».

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΙΜΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΕΛΗΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. (ΥΑΑΤ): ΤΠ14-0150 / 2.4.2019

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), ITALY (Ιταλία) (Tel: +39 049 9597737)
e-mail: info@zapispa.com, website: www.zapispa.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: AGROTECHNICA OBEE

ΜΗΝ ΣΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Lot No.) :
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date):

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (Net weight):
5 κιλά (kg)
(περιέχει δόλωματα / κύβους των 10 γραμμαρίων)

1969 50 2019 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Κατηγορία χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες. **Μέθοδος εφαρμογής**: Δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). **Δόση και συχνότητα εφαρμογής**: • **Ποντικοι (Mus musculus)**: 20-40 γρ. δολωματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσοτερα από ένας δολωματικοι σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικων σταθμων θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. • **Αρουραία (Rattus norvegicus)**: 100-200 γρ. δολωματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσοτερα από ένας δολωματικοι σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικων σταθμων θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**: • Πριν το χρησιμοποιήσετε, διάβαστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. • Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικων, τους χωρους δραστηριότητας τους, καθώς και την πιθανή αιτία και εκταση της προσβολής. • Καθάρισε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποιες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χαμενοι σπόροι ή απορριματα τροφων). Ωστοσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμενο από τρωκτικά χωρο ακριβώς πριν την εναρξη της διαδικασίας αντιμετωπισης, καθώς κατι τετοιο διαταρασσει τον πληθυσμό των τρωκτικων και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. • Το προϊόν θα πρεπει να χρησιμοποιεται μονο στο πλαισιο της ολοκληρωμενης αντιμετωπισης τρωκτικων που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, οπου ειναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης. • Εξέταστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικων μετρων (καλύψτε τις οπές, απομακρυνετε πιθανές πηγες τροφής και νερού στις οποιες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιωσετε την προλληψη των δολωμάτων και να μειωσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικων. • Οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να τοποθετουνται κοντα στα σημεία οπου εχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικων (π.χ. τροφοσυλλογες διαδρομες, σημεια καταδυσεις φωλιάς, σημεία τροφής, τρυπες, λαγουμια, κ.λπ.). • Οπου ειναι δυνατό, οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να στερεωνονται στο εδαφος ή σε αλλες κατασκευες. • Οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να φερουν σαφη σημανση που να δηλωνει ότι περιεχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρεπει να μετακινουνται ή να ανοιγονται. • Οταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποιες εχει γινει εφαρμογη με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να επισημανονται καθ' ολη τη διαρκεια εφαρμογής ωστε να υπαρχει ειδοποιηση που να επιτρεψει τον κινδυνο πρωτογενους ή δευτερογενους δηλητηριασης από το αντιπηκτικο, καθώς και τα μέτρα πρωτων βοηθειων που πρεπει να ληφθουν σε περιπτωση δηλητηριασης. • Τα δολώματα θα πρεπει να ασφαλίζονται με τετοιο τρόπο ώστε να μην ειναι δυνατο να συρθουν εκτος του δολωματικου σταθμού. • Τοποθετήστε τα δολώματα μακρία από σημεια στα οποια ειχαν προσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικιδια ζωα, παραγωγικά ζωα και αλλα ζωα μη στοχοι. • Τοποθετήστε τα δολώματα μακρία από τροφιμα, ποτα και ζωοτροφες, καθώς και μακρία από μαγειρικά σκευη ή επιφανειες που ερχονται σε επαφή με αυτά. • Μην τρωτε, μην πινετε και μην καπνιζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλυνετε τα χερια σας και τις περιοχες του σωματος σας που εχουν ερθει σε αμεση επαφη με το προϊόν αμέσως μετά τη χρηση του. • Εάν η προσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά ειναι χαμηλη σε συγκριση με το μεγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινησετε τους δολωματικους σταθμους σε αλλα σημεία και να χρησιμοποιησετε δολωματα με διαφορετικη συνθεση. • Εάν μετά από 35 ημέρες από την εναρξη της εφαρμογής, συνεχιζεται η καταναλωση δολωμάτων και δεν παρατηρειται καμία μειωση στη δραστηριότητα των τρωκτικων, τότε θα πρεπει να προσδιοριστει η πιθανη αιτία που το προκαλεί. Σε περιπτωση που εχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, ειναι πιθανον τα τρωκτικα να εχουν αναπτυξει ανθεκτικοτητα. Σε αυτή την περιπτωση, εξετάστε το ενδεχομενο χρησης ενος μη αντιπηκτικου τρωκτικοκτονου, κατά περιπτωση, η ενος ισχυροτερου αντιπηκτικου τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρησης παγιδων, ως ενα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. • Απομακρυνετε τα υπολειμματα δολώματος και τους δολωματικους σταθμους μετά τη λήξη της περιοδου αντιμετωπισης.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: -** Οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να επιθεωρουνται τουλαχιστον ανά 2-3 ημερες αμεσως μετά την εναρξη της εφαρμογής και τουλαχιστον σε εβδομαδιαία βαση στη συνεχεια, ώστε να ελεγχεται εαν το δολωμα εχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοι σταθμοί παραμενουν άθικτοι, καθώς και να απομακρυνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπλήρωνετε το δολωμα όταν ειναι απαραιτητο.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: -** Οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να επιθεωρουνται 5-7 ημέρες μετά την εναρξη της εφαρμογής και τουλαχιστον σε εβδομαδιαία βαση στη συνεχεια, ώστε να ελεγχεται εαν το δολωμα εχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοι σταθμοί παραμενουν άθικτοι, καθώς και να απομακρυνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπλήρωνετε το δολωμα όταν ειναι απαραιτητο.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: -** Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετήστε τους δολωματικους σταθμους σε χωρους οι οποιοι δεν ειναι πιθανό να πλημμυρισουν. - Οι δολωματικοι σταθμοί θα πρεπει να επιθεωρουνται [σε περιπτωση ποντικων, τουλαχιστον ανά 2-3 ημέρες από την εναρξη] [σε περιπτωση αρουραίων, 5-7 ημέρες μετά από την εναρξη] της εφαρμογής και τουλαχιστον σε εβδομαδιαία βαση στη συνεχεια, ώστε να ελεγχεται εαν το δολωμα εχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοι σταθμοί παραμενουν άθικτοι, καθώς και να απομακρυνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπλήρωνετε το δολωμα όταν ειναι απαραιτητο. - Αντικαθιστατε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικο σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρυπους.

• **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: -** Κατά το τέλος της περιοδου αντιμετώπισης, απορρίπτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτησεις.

• **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: -** Αποθηκευστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χωρο. Διατηρεστε το δοχείο κλειστό και μακρά από το ηλιακό φως. - Αποθήκευστε σε χωρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζωα και παραγωγικά ζωα. - Διάρκεια ζωης προϊόντος: 2 έτη.

• **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -** Λογω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικων τρωκτικοκτόνων, απαιτουνται 4 εως 10 ημέρες από την καταναλωση του δολωματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. - Το τρωκτικό μπορεί να ειναι φορεας νόσων. Μην εχουν εκτεθεί νεκρά τρωκτικά με γυμνά χερια, κατά την απορριψή τους, χρησιμοποιειστε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες. - Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

220520