

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

ADAPTOR 80 WG



ADAPTOR 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		γραμμ./100 lt φυκαστικό υγρό	γραμμ/ στρέμμα	Όγκος φυκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα)	
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ φρουτ, Φράστα, Κήπο, Περγαμόντο, Νεραντζάδα)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp.)	250 - 300	250 - 450	100 - 150	Τρεις (3) ψεκασμοί: Ο πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης. Ο δευτέρος ψεκασμός τον Ιούλιο. Ο τρίτος ψεκασμός τον Οκτώβριο - Νοέμβριο (BBCN 39-91).
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φυτόφθορα Λαιμού και Ριζών (<i>Phytophthora</i> sp.)	250 - 300	200 - 360	80 - 120	Τρεις (3) ψεκασμοί: Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο. Ο δευτέρος ψεκασμός τον Ιούλιο. Ο τρίτος ψεκασμός τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο (BBCN 39-91).
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιίσμα)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 - 300	75 - 330	30 - 110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10 - 14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (BBCN 57-85).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι σδημίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΜΕΤΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή: 3. Αμπελί (οινοποιίσμα): 4 ανά 10 - 14 ημέρες.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΩΠΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ADAPTOR 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρηματοποιείτε αιυτό το προϊόν.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη | φόρτωση, εφαρμογή και κατά την επανεισόδη στην καλλιέργεια.
- Διάβεστε περισχόμενο | περιέκτη ούμφανα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χρηγούετε τίποτα από το στόμα σε ατομικά, που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Σε περίπτωση εισονήσης: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με αθόντο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα δέρμα: Πλύνετε αμέσως με αθόντο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα, στα οποία έπεσε σκευασία.

ΑΤΤΑ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

210 77 93 777

UFI: MPY0-9NUD-080R-D1YQ

ΕΠΙΒΛΑΣΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



ADAPTOR 80 WG

Fosetyl Al (Φοσετύλ-Αλ) 80%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

FOSETYL AL : 80.00 % B/B

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ : 16.70 % B/B

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 61023 | 3.3.2021

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ASCENZA AGRO S.A.,

Alameda dos Oceanos Lote 1.06.1.1 – 3^Α Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ |

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: AGROTECHNICA O.B.E.E.



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Agrotechnica

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263

info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu



ΕΣΥΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το ADAPTOR 80 WG παρουσιάζει συμπλακτική και αποτλαστική κινήση και δρά παρεμποιώνει τη διάσταση των οποιων, αλλά και επάγνωτας μηχανισμούς αμύνας των φυτών.	
• ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.	
• ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του φυκαστικού μηχανήματος μεχρι τη μερά. Προσθέστε στο υπόλοιπο πλήρωμα δρογέλιο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό απελευθερώντας την αναδοσην.	
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Καθαρίστε την καλύπτη και τη στρώματα της τριτης (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι ο φόρος και άλλα τα ίχνα του προϊόντος να έχουν απαγορευθεί.	
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΗΣΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ): Επεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράστα, Περγαμόντο, Νεραντζάδα): 15. Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (οινοποιίσμα): 25.	
• ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δύσεις εφαρμογής στις ελληνικές εδαφολιαστικές συνθήκες, εδώδον προϋπονταί να οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.	
• ΣΥΝΑΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνιστάται η ανάνεωση του ADAPTOR 80 WG με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν δε πρέπει να εφαρμοστεί, αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα από εφαρμογή με παραφύλακο λόδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λίπασματα ακότοτα.	
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα πρέπει να δοστικτυνθεί Fosetyl, η οποία ανήκει στην ομάδα PRAC. Συνιστάται η εναλλαγή των μηκοτόνων που δεν ανήκουν στην ομάδα προκειμένου να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.	
• ΟΔΗΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας του, σε μέρος έπιπλο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφομενή ημερομηνία παρασκευής.	
• ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του, σε μέρος έπιπλο, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφομενή ημερομηνία παρασκευής.	
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε	
• ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : συσκευασία	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :	

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : συσκευασία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : συσκευασία

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: συσκευασία

1 κιλό (kg)

CMYK